



EDITAL Nº 01/2021
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 01 - ENFERMEIRO I
(Neonatologia)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Quem não tem cão, caça com gato.



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Um recém-nascido de 38 semanas de idade gestacional, com peso de 4.050g, interna por hipoglicemia e necessita punção de calcâneo para controle da glicemia capilar. Considerando o recém-nascido e o procedimento realizado, assinale a alternativa que apresenta as medidas não farmacológicas de alívio da dor que podem ser indicadas.

- (A) Administração de substância adocicada por via oral, sucção não nutritiva e aplicação de anestésico local.
- (B) Contato pele a pele, amamentação e administração de fentanil intramuscular.
- (C) Aplicação de anestésico local, aplicação de escala de avaliação da dor e sucção não nutritiva.
- (D) Sucção não nutritiva, administração de substância adocicada por via oral e contato pele a pele.
- (E) Aplicação de escala de avaliação da dor, contato pele a pele e amamentação.

02. Com relação aos cuidados com a pele do recém-nascido, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Recomenda-se o uso de curativo de hidrocoloide para proteção de partes moles da narina e septo de recém-nascido em uso de CPAP nasal.
- (B) Nos recém-nascidos pré-termo menores que 30 semanas de idade gestacional e nos menores que 1.000 g, é recomendado o uso de incubadora de parede dupla com umidificação.
- (C) O banho de imersão está indicado apenas para recém-nascidos maiores de 34 semanas.
- (D) Antes da inserção de cateteres venosos, utilizar clorexidina aquosa para antisepsia da pele de recém-nascidos pré-termo, removendo o excesso da solução com água estéril ao término do procedimento.
- (E) O primeiro banho do recém-nascido deve ser realizado imediatamente após o nascimento.

03. Durante a reanimação, a massagem cardíaca deve ser iniciada se, após 30 segundos de ventilação adequada com oxigênio suplementar, o recém-nascido apresentar frequência cardíaca inferior a 60 batimentos por minuto. Com relação ao procedimento de massagem cardíaca no recém-nascido, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A compressão cardíaca deve ser realizada no terço inferior do esterno, logo abaixo da linha intermamilar, preservando-se o apêndice xifoide.
- () Deve-se utilizar preferencialmente a técnica dos dois dedos (indicador e médio), sendo a técnica dos dois polegares aplicada quando houver desproporção entre o tamanho das mãos do reanimador e do tórax.
- () A profundidade da compressão deve ser de cerca de 1/3 da dimensão anteroposterior do tórax.
- () A massagem cardíaca e a ventilação devem ser realizadas de forma sincrônica com uma relação de 15:1, ou seja, 15 movimentos de massagem para um movimento de ventilação.
- () A massagem pode ser suspensa após um minuto, mesmo se a frequência cardíaca estiver abaixo de 60 batimentos por minuto.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – V – F.
- (B) F – F – F – V – V.
- (C) V – F – V – F – F.
- (D) V – V – V – F – F.
- (E) F – V – F – F – V.

04. Considere as afirmações abaixo referentes à icterícia neonatal e fototerapia.

- I - O aparecimento de icterícia nas primeiras 24-36 horas de vida alerta para a presença de doença hemolítica hereditária, destacando-se entre elas a incompatibilidade sanguínea Rh, a incompatibilidade ABO e a presença de antígenos eritrocitários irregulares.
- II - Uma das causas mais frequentes de icterícia em prematuros com idade gestacional menor que 34 semanas são os extravasamentos sanguíneos, seja por hematomas extensos devido a parto traumático, seja por hemorragia peri-intraventricular.
- III- Idade gestacional acima de 40 semanas, independentemente do peso ao nascer, é considerada um dos fatores de risco mais importantes para hiperbilirrubinemia significativa.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

05. Nos últimos anos, houve um constante crescimento da notificação de casos de sífilis congênita no país. Em relação à prevenção, transmissão, quadro clínico e tratamento da sífilis congênita, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Todas as gestantes devem ser submetidas à triagem sorológica por meio de teste reagínico no início da gestação, no início do terceiro trimestre e no parto.
- () O *Treponema pallidum* dissemina-se através da placenta, cordão umbilical, membranas amnióticas, líquido amniótico e leite materno.
- () Mais de 60% dos recém-nascidos são assintomáticos ou apresentam poucos sinais ao nascer. Porém, quando sintomáticos, hepatoesplenomegalia, prematuridade, restrição de crescimento intrauterino e lesões cutaneomucosas são as manifestações mais comuns.
- () O regime terapêutico preferencial em casos de sífilis congênita comprovada é o uso de penicilina G benzatina intramuscular.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) V – F – V – V.

06. Mesmo com os avanços mais recentes no atendimento do recém-nascido criticamente doente, a enterocolite necrosante continua sendo um desafio à equipe cuidadora e aos familiares das crianças acometidas. Em relação à enterocolite necrosante, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A enterocolite necrosante geralmente se manifesta antes do início da alimentação por via enteral.
- () Entre os fatores envolvidos encontram-se a oferta inadequada de oxigênio ao trato gastrointestinal, existência de flora bacteriana entérica patogênica e presença de substrato facilitador da proliferação bacteriana na dieta enteral.
- () Nenhum agente patogênico específico está consistentemente associado à eclosão da enterocolite necrosante.
- () Diante da suspeita de enterocolite necrosante, recomenda-se manter alimentação enteral com leite materno.
- () São medidas preventivas de enterocolite necrosante a rigorosa higiene das mãos, infraestrutura física e de pessoal adequada ao número de leitos e utilização do leite da própria mãe e/ou nutrição de banco de leite humano na nutrição enteral do recém-nascido.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) V – F – F – F – V.
- (D) F – V – V – F – V.
- (E) V – F – F – V – F.

07. O pulmão do recém-nascido é especialmente vulnerável a lesões. Sobre esse tema, observe os itens abaixo.

- I - Prematuridade.
- II - Ventilação por pressão positiva.
- III- Infecção.

Quais são considerados fatores associados ao desenvolvimento de lesão pulmonar?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

08. Qual o diagnóstico de enfermagem mais acurado para um recém-nascido prematuro que, ao receber dieta por via enteral, apresenta capacidade prejudicada de coordenar a resposta de sucção/deglutição?

- (A) Deglutição prejudicada.
- (B) Padrão ineficaz de alimentação do lactente.
- (C) Amamentação ineficaz.
- (D) Amamentação interrompida.
- (E) Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades corporais.

09. A passagem de _____ é um procedimento particularmente útil em recém-nascidos prematuros extremos e bebês em uso de hidratação venosa e nutrição parenteral por mais de _____ dias e com manuseio restrito.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) cateter umbilical arterial – sete
- (B) cateter umbilical venoso – dez
- (C) cateter central de inserção periférica – sete
- (D) cateter central de inserção periférica – dez
- (E) cateter venoso periférico – sete

10. Em relação ao exame físico geral do recém-nascido, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A postura do recém-nascido normalmente é simétrica e fletida, semelhante à fetal.
- (B) Pela simples observação do recém-nascido, já se conseguem diversas informações importantes, como a presença de malformações e faces típicas de algumas síndromes.
- (C) A postura do recém-nascido pode estar assimétrica se houver algum transtorno como fratura de clavícula ou membros, paralisia braquial, lues congênita (pseudoparalisia de Parrot), infecções ou comprometimento neurológico.
- (D) O aspecto geral, a atividade, a intensidade do choro, a movimentação e o estado de hidratação são informações que devem constar no exame físico geral.
- (E) O choro fraco ou gemência sempre indicam lesões neurológicas graves.

11. Considerando as definições adotadas pela Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, a qual institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os termos às suas respectivas definições.

- (1) Dano
 - (2) Evento adverso
 - (3) Segurança do paciente
 - (4) Gestão de risco
-
- () Aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.
 - () Incidente que resulta em dano ao paciente.
 - () Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
 - () Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 1 – 4.
- (B) 3 – 4 – 2 – 1.
- (C) 4 – 2 – 1 – 3.
- (D) 4 – 2 – 3 – 1.
- (E) 1 – 4 – 3 – 2.

12. Considere as seguintes afirmações sobre a vacinação dos trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, e assinale-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.
- () O empregador deve solicitar ao trabalhador que realize o controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, e este providenciar, se necessário, seu reforço.
- () O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação, devendo, nestes casos, guardar documento comprobatório e mantê-lo disponível à inspeção do trabalho.
- () O registro da vacinação é de responsabilidade do trabalhador, tendo este que providenciar um documento para sua comprovação.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – F – F – V.

13. Em relação ao transporte neonatal inter-hospitalar, é correto afirmar que:

- (A) o transporte neonatal pode ser realizado por qualquer profissional da saúde, não necessitando ter conhecimento dos procedimentos necessários para a assistência ao neonato gravemente enfermo.
- (B) no transporte aéreo, a aceleração nas decolagens e a desaceleração durante os pousos causam, momentaneamente, diminuição da pressão intracraniana.
- (C) toda a medicação necessária para a reanimação deve estar guardada em uma caixa lacrada no início do deslocamento do paciente.
- (D) deve-se pedir autorização escrita ao responsável legal pelo recém-nascido para a remoção. Mesmo nos casos de risco iminente de vida, o profissional deve aguardar a autorização para transferência do neonato.
- (E) durante o transporte, deve-se ter o cuidado de verificar a permeabilidade das vias aéreas. Observar a posição do pescoço do recém-nascido, a presença de secreções em vias aéreas e, se estiver intubado, a posição e a fixação da cânula traqueal.

14. Assinale a alternativa correta em relação a maneiras de evitar a hipotermia em recém-nascidos prematuros.

- (A) Envolver o recém-nascido prematuro em cobertores e cueiros reduz a perda evaporativa da pele e propicia temperatura mais elevada à admissão em recém-nascido pré-termo com idade gestacional menor que 32 semanas.
- (B) Nos pacientes em ventilação mecânica, recomenda-se aquecer e umidificar os gases do ventilador, para elevar a perda evaporativa de calor pelo trato respiratório, facilitando o aumento da temperatura corporal.
- (C) Incubadora umidificada é a melhor opção para recém-nascidos prematuros extremos, que geralmente apresentam grande perda transepidermica de água.
- (D) Posição canguru visa manter os prematuros aquecidos, sem usar incubadora, favorecer a amamentação e o vínculo mãe-filho e não tem interferência no tempo de permanência no hospital.
- (E) O preaquecimento dos fluidos para infusão intravenosa, especialmente se o volume for grande, não tem repercussão no controle térmico do prematuro.

15. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as avaliações das técnicas de amamentação aos respectivos sinais e características.

- (1) Técnica e pega adequadas
- (2) Técnica e pega inadequadas

- () Bochechas do bebê encovadas a cada sucção.
- () Lábio inferior virado para fora.
- () Mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada.
- () Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido).
- () Dor na amamentação.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 2 – 1 – 2.
- (B) 2 – 2 – 1 – 1 – 2.
- (C) 1 – 1 – 2 – 2 – 1.
- (D) 2 – 1 – 1 – 1 – 2.
- (E) 1 – 2 – 2 – 2 – 1.

16. Considere as afirmações abaixo quanto às dificuldades no aleitamento materno.

- I - Mamilos planos ou invertidos impedem a amamentação.
- II - Enquanto o bebê não estiver sugando vigorosamente, orientar a mãe a não estimular as mamas, evitando o ingurgitamento.
- III - No ingurgitamento mamário patológico, a mama fica excessivamente distendida, causando grande desconforto, às vezes acompanhado de febre e mal-estar. Pode haver áreas difusas avermelhadas, edemaciadas e brilhantes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

17. Ao nascer, o recém-nascido passa por alterações fisiológicas para promover a sua adaptação ao ambiente extrauterino. Sobre esse tema, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Quanto menor a idade gestacional e/ou o peso ao nascer, o risco de haver necessidade de procedimentos de reanimação no recém-nascido é maior.
- () Com um minuto de vida, a saturação de oxigênio situa-se em torno de 80%-85%, só atingindo valores de 90% no quinto minuto de vida. Portanto, o processo de transição para alcançar saturação de oxigênio de 97%-100% requer dez minutos ou mais em recém-nascidos saudáveis que respiram em ar ambiente.
- () Os recém-nascidos pré-termo e os pequenos para a idade gestacional são mais propensos a hipoglicemia durante a adaptação à vida extrauterina por possuírem reservas de glicose diminuídas, devendo-se dosar a glicemia utilizando fita teste com 2, 4, 6, 12, 24, 48 e 72 horas de vida para prevenir essa condição.
- () O Apgar é uma nota atribuída à vitalidade do recém-nascido, por meio da avaliação da frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e coloração da pele do bebê, iniciando a avaliação no quinto minuto de vida, devendo ser repetida a cada cinco minutos até atingir nota igual ou maior a sete.
- () A transição completa da circulação fetal para a neonatal ocorre imediatamente após o nascimento, com o fechamento do canal arterial e redução da resistência vascular.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) V – F – V – F – F.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – V – F – F.
- (E) F – V – V – F – F.

18. Considere o exame físico geral do recém-nascido quanto à avaliação neurológica e numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os reflexos primitivos às suas respectivas definições.

- (1) Reflexo de Moro
 - (2) Reflexo de Sucção
 - (3) Reflexo de Preensão
 - (4) Reflexo de Fuga à Asfixia
- () Manifesta-se quando os lábios da criança são tocados por algum objeto, desencadeando-se movimentos dos lábios e da língua, permitindo a alimentação por via oral após 32 a 34 semanas de idade gestacional.
- () Avalia-se, colocando a criança em decúbito ventral no leito com a face voltada para o colchão. Em alguns segundos, o recém-nascido deverá virar o rosto para um dos lados.
- () Desencadeia-se por algum estímulo brusco; sua resposta assimétrica ou a ausência do reflexo pode indicar lesões nervosas, musculares ou ósseas, que devem ser avaliadas.
- () Obtém-se com leve pressão do dedo do examinador na palma das mãos do recém-nascido e abaixo dos dedos do pé.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 1 – 2.
- (B) 4 – 2 – 1 – 3.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 4 – 2 – 3 – 1.
- (E) 2 – 4 – 3 – 1.

19. Considere as seguintes afirmações sobre infecções hospitalares (IH) neonatais.

- I - Os principais fatores de risco relacionados às condições locais para IH nas unidades de neonatologia são: a superlotação e a desproporção entre número de recém-nascidos internados e número de profissionais da equipe de saúde.
- II - A lavagem das mãos é a medida preventiva mais importante contra infecção, visando à remoção da flora transitória da pele e pode ser substituída pelo uso de solução de álcool com glicerina a 2% ou uso de luvas.
- III- A pesquisa de colonização ou infecção por bactérias multirresistentes deve ser realizada em recém-nascidos transferidos de outros serviços com menos de 24 horas de internação, mantendo-se precauções de contato (isolamento) até obter o resultado dos exames de rastreio.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

20. Considerando as orientações do Manual Técnico do Método Canguru e suas diretrizes de cuidado, assinale as afirmações com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O Método Canguru é um modelo de atenção perinatal voltado para a atenção qualificada e humanizada que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial com uma ambiência que favoreça o cuidado ao recém-nascido e à sua família.
- () A aplicação do Método Canguru tem início com a colocação da criança em contato pele a pele, somente com a mãe, na posição canguru, estimulando o aleitamento materno e permitindo maior frequência, precocidade e duração.
- () O Método Canguru compreende três etapas e tem como critérios estabelecidos para inclusão do recém-nascido o peso mínimo de 1.250 g, estabilidade clínica, nutrição enteral plena e disponibilidade da mãe de permanecer em alojamento conjunto com o recém-nascido.
- () A Portaria GM/MS nº 930, de 10 de maio de 2012, define as diretrizes e os objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave, comprometidos com os pilares do Método Canguru, estimulando a participação e o protagonismo da mãe e do pai nos cuidados ao recém-nascido.
- () A posição canguru consiste em manter o recém-nascido em contato pele a pele somente de fraldas, na posição vertical, junto ao peito dos pais; uma das suas vantagens é o desenvolvimento de uma maior competência e confiança dos pais no cuidado do seu filho, inclusive após a alta hospitalar.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – V.
- (B) F – V – V – F – V.
- (C) V – F – F – V – V.
- (D) V – V – F – V – V.
- (E) V – F – F – V – F.

21. A hipotermia é uma estratégia terapêutica recomendada para prevenção e redução de lesão cerebral e sequelas neurológicas em recém-nascidos após um incidente hipóxico-isquêmico. O resfriamento corporal deve ser iniciado antes de _____ e mantido por _____, mantendo-se a temperatura retal ou esofágica _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) seis horas de vida – 72 horas – entre 32°C e 34°C
- (B) vinte e quatro horas de vida – 48 horas – entre 32°C e 34°C
- (C) seis horas de vida – 72 horas – abaixo de 32°C
- (D) doze horas de vida – 24 horas – abaixo de 32°C
- (E) vinte e quatro horas de vida – 72 horas – abaixo de 32°C

22. De acordo com o Art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, são princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**:

- (A) preservação da autonomia das pessoas.
- (B) igualdade da assistência à saúde.
- (C) integralidade de assistência.
- (D) centralização político-administrativa no município.
- (E) participação da comunidade.

23. Assinale a alternativa correta no que se refere ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil.

- (A) É vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento.
- (B) É dever do servidor público comunicar todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exceto nos casos de sigilos.
- (C) É ilegal que o servidor público participe de greves e movimentos políticos.
- (D) É dever do servidor público ter critérios para permitir a fiscalização de todos os atos ou serviços que executa.
- (E) É vedado ao servidor público solicitar ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, mas pode recomendar para familiares a participação em Comissões para trabalho de confiança.

24. O novo Código de Ética da Enfermagem avança e reforça Direitos dos Profissionais de Enfermagem. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um desses direitos.

- (A) Liberdade do exercício da Enfermagem.
- (B) Autonomia da profissão.
- (C) Dignidade da profissão.
- (D) Exercer atividades multiprofissionais.
- (E) Revelar informações confidenciais em razão do exercício profissional.

25. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Brasil aprovou, na íntegra, o texto da Sociedade Brasileira de Pediatria, relativo aos direitos da criança e do adolescente hospitalizados. Entre estes direitos estão:

1. Direito à proteção à vida e à saúde, com absoluta _____ e sem qualquer forma de discriminação.
2. Direito a ser acompanhado por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de sua hospitalização, bem como receber _____.
3. Direito a _____ de sua mãe ao nascer.
4. Direito a receber _____ sem restrições.
5. Direito a _____, quando existem meios para evitá-la.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas acima.

- (A) prioridade – visitas – não ser separado – aleitamento materno – não sentir dor
- (B) dignidade – presentes – ficar no colo – proteção – proteção à violência
- (C) prioridade – carinho – ficar no quarto – cuidado – proteção à violência
- (D) dignidade – os avós – ficar sob o olhar – candura – não sentir dor
- (E) dignidade – lembranças – receber carinho – aconchego – não sentir dor

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 01/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 01

ENFERMEIRO I (Neonatologia)

01.	D	11.	D	21.	A
02.	ANULADA	12.	B	22.	D
03.	C	13.	E	23.	ANULADA
04.	D	14.	C	24.	E
05.	B	15.	A	25.	A
06.	D	16.	C		
07.	E	17.	B		
08.	B	18.	C		
09.	C	19.	A		
10.	E	20.	C		