



EDITAL Nº 06/2025 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 67

FÍSICO I (Medicina Nuclear)

01.	D	11.	D	21.	E
02.	A	12.	D	22.	A
03.	A	13.	A	23.	E
04.	A	14.	D	24.	D
05.	B	15.	C	25.	A
06.	C	16.	C		
07.	D	17.	A		
08.	A	18.	C		
09.	C	19.	D		
10.	B	20.	D		

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 06/2025

DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Superior

PS 67 - FÍSICO I
(Medicina Nuclear)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

O segredo é começar, não esperar.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

INSTRUÇÕES



- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame, portar relógios**, armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos/próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, réguas, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. De acordo com a norma ANSN 3.01 (antiga CNEN NN 3.01), assinale a alternativa **INCORRETA** no que diz respeito ao cálculo da dose efetiva.

- (A) A dose efetiva é dada pela soma das doses decorrentes da exposição externa no período especificado e da exposição interna devido a incorporações de radionuclídeos no mesmo período.
- (B) As atividades, incorporadas pela inalação ou ingestão de radionuclídeos, devem ser obtidas por meio do programa de monitoração individual interna.
- (C) Os coeficientes de dose para inalação e para ingestão de radionuclídeos devem ser obtidos em publicações atualizadas da ICRP.
- (D) No cálculo, o somatório das doses efetivas comprometidas decorrentes da incorporação por ingestão tem um peso maior do que o somatório decorrente da incorporação por inalação.
- (E) As atividades, incorporadas por inalação ou ingestão de radionuclídeos, podem ser determinadas por técnicas previstas no programa de monitoração individual interna, tais como medição *in vivo*, medição de atividade em excretas e amostragem de ar, conforme o caso.

02. Com base na norma ANSN 3.01, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as responsabilidades descritas aos seus responsáveis.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Titular da instalação (2) Supervisor de proteção radiológica (3) Indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) | <ul style="list-style-type: none"> () Garantir que exista e seja implementado um Plano de Proteção Radiológica aprovado pela ANSN. () Coordenar ações de monitoração e de resposta a ocorrências radiológicas. () Utilizar corretamente os dosímetros individuais e comunicar anomalias observadas. () Assegurar recursos humanos e materiais para o cumprimento das normas de proteção radiológica. () Interromper imediatamente as atividades quando for detectada situação de risco radiológico grave. |
|---|---|

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 1 – 2.
- (B) 1 – 3 – 2 – 1 – 2.
- (C) 1 – 2 – 3 – 2 – 1.
- (D) 2 – 3 – 2 – 2 – 3.
- (E) 2 – 1 – 3 – 1 – 2.

03. Segundo a norma ANSN 3.01, em relação às liberações de efluentes radioativos, assinale a alternativa correta sobre as obrigações dos titulares.

- (A) Devem otimizar a proteção radiológica, garantindo que todas as liberações de efluentes radioativos estejam dentro dos níveis de restrição de dose autorizados para a pessoa representativa ou o grupo crítico, e devem monitorar, registrar e reportar essas liberações conforme exigido.
- (B) A monitoração das liberações pode ser restrita a determinados pontos internos da instalação, sem consideração da exposição da pessoa representativa ou grupo crítico, desde que haja justificativa documental.
- (C) Ajustes temporários nos níveis operacionais de liberação podem ser realizados sem documentação ou comunicação à ANSN, desde que durante períodos de operação considerados não críticos.
- (D) Os relatórios de monitoramento podem ser apresentados à ANSN em intervalos bienais, exceto quando ocorram liberações que ultrapassem os níveis autorizados.
- (E) A comunicação imediata à ANSN da liberação que exceda os níveis de restrição de dose é exigida apenas para a exposição da pessoa representativa, excluindo os grupos críticos dessa obrigatoriedade.

04. De acordo com a norma ANSN 3.05 (antiga CNEN NN 3.05), considere as afirmações abaixo sobre fontes radioativas de referência e instrumentos em Serviços de Medicina Nuclear.

- I - As fontes radioativas de referência são de uso exclusivo do Serviço de Medicina Nuclear e não podem ser compartilhadas com outros Serviços de Medicina Nuclear sob nenhuma circunstância.
- II - Fontes radioativas seladas de referência podem ser utilizadas para controle de qualidade dos instrumentos de medição de radiação, desde que sejam específicas para uso nas geometrias e energias compatíveis com as práticas autorizadas.
- III- É permitido o uso de medidor de atividade com detector do tipo Geiger-Müller, desde que devidamente calibrado para isso.
- IV - Monitores de taxa de dose e de contaminação de superfície, principais e reserva, devem ser calibrados a cada cinco anos, em datas não necessariamente distintas, e sempre após reparos ou suspeita de funcionamento irregular.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I, III e IV.

05. Com base na norma ANSN 3.05, em relação à internação do paciente injetado para terapia, analise as afirmativas abaixo e assinale-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A administração de doses terapêuticas de I-131 superiores a 1.850 MBq deve obrigatoriamente ser realizada em quarto de terapia previsto no Plano de Proteção Radiológica.
- () A internação de pacientes submetidos a terapias com radionuclídeos distintos do I-131 é obrigatória em todos os casos, independentemente da atividade administrada.
- () É obrigatório o uso de biombo blindado ou barreira protetora equivalente, junto ao leito, para a proteção do indivíduo ocupacionalmente exposto.
- () O quarto de terapia, sempre que ocupado por paciente injetado, deve estar sinalizado com símbolo internacional de radiação, classificação da área e conter tabuleta com dados do radiofármaco, registro da taxa de dose e identificação dos responsáveis.
- () A presença de acompanhante é proibida em qualquer situação, por risco de exposição, ainda que autorizada pelo supervisor de proteção radiológica.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – V – F.
- (C) F – F – V – F – V.
- (D) V – F – F – F – V.
- (E) F – V – V – V – F.

06. Considerando o conceito de eficiência intrínseca de um detector, conforme descrito por Tahuata (2014), assinale a alternativa que indica um fator que **NÃO** influencia a eficiência intrínseca.

- (A) Número atômico do elemento sensível do detector.
- (B) Tensão de operação, para detectores que utilizam campo elétrico.
- (C) Geometria e distância entre fonte e detector.
- (D) Estado físico do material do detector (sólido, líquido ou gasoso).
- (E) Sensibilidade da emulsão fotográfica (no caso de filmes).

07. De acordo com Tahuata (2014), sobre os efeitos estocásticos decorrentes da exposição à radiação ionizante, assinale a alternativa correta.

- (A) Esses efeitos apresentam um limiar de dose abaixo do qual não há risco de ocorrência.
- (B) A gravidade dos efeitos estocásticos é proporcional à dose absorvida.
- (C) A probabilidade de câncer radioinduzido é independente da sobrevivência de clones celulares modificados.
- (D) A leucemia radioinduzida apresenta período de latência mínimo de aproximadamente 2 anos, atingindo frequência máxima entre 5 e 7 anos após a exposição.
- (E) O período de aparecimento de cânceres radioinduzidos é uniforme e não ultrapassa 10 anos após a exposição.

08. Segundo Xavier (2014), a dosimetria citogenética é uma técnica utilizada para avaliar exposições a radiação ionizante. Com base nessa obra, assinale a alternativa correta sobre esse método.

- (A) A dosimetria citogenética é baseada na análise de aberrações cromossômicas em linfócitos de uma amostra de sangue venoso, comparando-as com uma curva de calibração do tipo Dose x Resposta produzida *in vitro*.
- (B) A dosimetria citogenética utiliza a análise de alterações na expressão gênica em células da medula óssea para estimar a dose de radiação recebida.
- (C) A técnica de dosimetria citogenética é aplicada apenas para avaliar exposições acidentais e não é adequada para monitoramento ocupacional.
- (D) A dosimetria citogenética não é eficaz para avaliar contaminação interna por radionuclídeos, como o trício, devido à sua distribuição não uniforme pelo corpo.
- (E) A dosimetria citogenética é uma técnica exclusivamente utilizada para avaliar exposições externas à radiação, não sendo aplicável para exposições internas.

09. Segundo a norma ANSN 8.01 (antiga CNEN NN 8.01), sobre os depósitos de rejeitos radioativos, assinale a alternativa correta.

- (A) O depósito de rejeitos classe 1 pode ser instalado em qualquer local do serviço, desde que haja barreiras físicas de proteção.
- (B) É obrigatório que os rejeitos destinados ao decaimento para posterior dispensa sejam mantidos misturados com outros materiais radioativos em uso, para facilitar o manuseio.
- (C) O depósito deve dispor de piso e paredes impermeáveis e de fácil descontaminação, além de meios para proteção contra incêndio e acesso restrito a pessoal autorizado.
- (D) Rejeitos líquidos podem ser armazenados sem bacias de contenção, desde que a quantidade seja pequena, e a embalagem seja resistente.
- (E) Rejeitos radioativos podem ser armazenados junto a produtos perigosos, como inflamáveis ou corrosivos, desde que sejam separados por divisórias físicas.

10. De acordo com a norma ANSN 6.02 (antiga CNEN NN 6.02), como são subdivididas as instalações radiativas para fins de aplicação da norma?

- (A) Em instalações que utilizam fontes seladas e instalações nucleares de grande porte.
- (B) Em instalações que utilizam fontes seladas, fontes não seladas, equipamentos geradores de radiação ionizante e instalações para produção de radioisótopos.
- (C) Em instalações de diagnóstico por imagem, pesquisa em saúde e produção industrial de radioisótopos.
- (D) Em depósitos de rejeitos radioativos e instalações radiativas médicas.
- (E) Em qualquer instalação que utilize radiação ionizante, sem distinção de tipo ou finalidade.

11. De acordo com Tauhata (2014), a predominância dos diferentes processos de interação dos fótons com a matéria depende tanto da energia do fóton quanto do número atômico (Z) do material. Considerando essa relação, assinale a alternativa correta.

- (A) O efeito fotoelétrico predomina em altas energias e em materiais de baixo número atômico (Z).
- (B) O espalhamento Compton é o principal mecanismo de interação em baixas energias de fótons, independentemente do material.
- (C) A produção de pares ocorre principalmente em energias abaixo de 100 keV, sendo mais comum em tecidos biológicos.
- (D) À medida que a energia do fóton aumenta, o efeito fotoelétrico diminui rapidamente, e o efeito Compton passa a predominar até energias de alguns MeV.
- (E) A probabilidade de produção de pares é independente da energia do fóton e aumenta linearmente com o número atômico (Z) do material.

12. Segundo a NR-32, em relação a rotinas e estrutura predial do Serviço de Medicina Nuclear, assinale a afirmativa correta.

- (A) As áreas livres, supervisionadas e controladas devem ter pisos e paredes impermeáveis que permitam a descontaminação.
- (B) É obrigatória a instalação de exaustor no local da administração endovenosa de radiofármacos.
- (C) Sempre que for interrompida a atividade de trabalho, deve ser realizada a monitoração de superfícies e de extremidades e corpo inteiro dos trabalhadores.
- (D) O quarto de internação para a administração de radiofármacos e o local de decaimento de rejeitos radioativos são áreas de acesso controlado.
- (E) As torneiras da pia com cuba da sala de manipulação de fontes radioativas, quando não contaminadas, podem ser acionadas manualmente.

13. Em tomografia computadorizada (TC), considerando o ajuste de apenas um parâmetro, qual ajuste de técnica de aquisição de um protocolo permite a redução do $CTDI_{vol}$?

- (A) Ajustar a modulação de corrente conforme o tamanho do paciente.
- (B) Aumentar a espessura do corte de reconstrução com a mesma colimação do feixe.
- (C) Reduzir a colimação do feixe.
- (D) Reduzir o *pitch*.
- (E) Utilizar um filtro de convolução para baixo contraste.

14. Sobre a utilização da aquisição da TC para a correção da atenuação na tomografia por emissão de pósitrons (PET), é correto afirmar que

- (A) a TC fornece fatores de correção de atenuação mais ruidosos do que a fonte Ge-68.
- (B) a TC reduz a dose efetiva do paciente em comparação ao uso de fonte de Ge-68.
- (C) as imagens adquiridas com agente de contraste na TC não causam nenhum tipo de interferência ou artefato nos fatores de correção de atenuação para a PET.
- (D) os artefatos de correção de atenuação podem ser decorrentes de movimentos do paciente entre as aquisições das duas modalidades de imagem.
- (E) os fatores de correção da atenuação da TC não precisam de ajustes para a energia de aniquilação do fóton.

15. Sobre aquisição e avaliação do $CTDI_{vol}$ na TC, podemos afirmar que

- (A) os valores de $CTDI_{vol}$ para exames na região do tórax devem ser maiores do que na região abdominal.
- (B) o *phantom* de 32 cm de diâmetro apresenta o $CTDI_{vol}$ relativo aos exames de crânio e corpo de pacientes adultos.
- (C) a medida realizada com câmara de ionização no formato lápis deve ser realizada em modo de aquisição sequencial/axial.
- (D) as medidas realizadas no centro e na periferia dos *phantoms* de PMMA são utilizadas para calcular diretamente o $CTDI_{vol}$ de uma aquisição helicoidal.
- (E) a exatidão do indicador de dose deve ser $\pm 15\%$.

16. O teste de desempenho que avalia se há coincidência entre alinhamento do objeto e plano da imagem de TC resultante é

- (A) exatidão do indicador do posicionamento da mesa.
- (B) exatidão do indicador do deslocamento horizontal da mesa.
- (C) coincidência entre os indicadores do plano externo e interno do plano irradiado.
- (D) exatidão da espessura de corte.
- (E) exatidão do espaçamento de corte.


17. Considerando a legislação brasileira vigente, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando o teste de controle de qualidade de medidores de atividade à sua periodicidade mínima de realização.

- | | |
|---------------|-------------------------|
| (1) Diário | () Linearidade |
| (2) Mensal | () Geometria |
| (3) Semestral | () Precisão e exatidão |
| (4) Anual | () Reprodutibilidade |
| | () Repetibilidade |

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 3 – 3 – 1.
- (B) 3 – 4 – 3 – 4 – 1.
- (C) 4 – 3 – 4 – 2 – 2.
- (D) 4 – 3 – 4 – 3 – 2.
- (E) 4 – 4 – 3 – 2 – 1.

18. Observe a imagem abaixo.



Sobre a imagem acima, que apresenta o gráfico da taxa de contagem obtida [kcps] em cada tipo de evento (imediatos, verdadeiro, aleatório e espalhado) em função da concentração radioativa [kBq/cc] de um teste de desempenho de um equipamento de PET/CT, considere as afirmações abaixo.

- I - A curva A apresenta a taxa de eventos imediatos (*prompts*) detectados pelo equipamento.
- II - A probabilidade de detecção de eventos representados na curva B aumenta conforme cresce a taxa total de eventos únicos registrados.
- III - Considerando um valor de concentração de atividade fixo, a somatória das taxas de contagens das curvas B, C, D, E e F é equivalente à taxa de contagens da curva A.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

19. Em medicina nuclear, o processo de contagem de fótons em detectores de cintilação (gama câmaras, PET) é intrinsecamente aleatório. Qual distribuição estatística é o modelo fundamental para descrever a variabilidade (ruído aleatório) inerente a essas medições?

- (A) Distribuição Binomial.
- (B) Distribuição de Rayleigh.
- (C) Distribuição Exponencial.
- (D) Distribuição de Poisson.
- (E) Distribuição Normal (Gaussiana).


20. Em imagens de medicina nuclear, o efeito de volume parcial é uma limitação que afeta a quantificação da atividade. Qual afirmação sobre esse efeito está correta?

- (A) É um artefato causado por fótons espalhados e corrigido pela correção de atenuação.
- (B) Resulta em superestimação da concentração de atividade real em estruturas "quentes" pequenas (*hot spots*) devido ao *spill-in* de atividade do tecido circundante.
- (C) É unicamente causado pelo efeito de fração de tecido (*tissue fraction effect*), independentemente da resolução espacial.
- (D) É causado pela resolução espacial finita do sistema e leva à subestimação da atividade em estruturas menores que o dobro da FWHM.
- (E) É minimizado usando detectores com alto número atômico (Z), como o BGO, devido à sua superior resolução energética.

21. A decisão de liberar um paciente após a administração de um radiofármaco não selado para fins terapêuticos deve ser baseada em uma avaliação dos riscos de exposição para público e cuidadores, em conformidade com as diretrizes internacionais e a legislação brasileira. Considerando as vias dominantes de exposição e os grupos populacionais de maior risco após a terapia com radiofármacos, qual das afirmações abaixo está correta?

- (A) Para radionuclídeos emissores beta puros, como o Y-90, a principal preocupação radiológica para as pessoas próximas é a irradiação externa de fótons gama de alta energia.
- (B) A dose efetiva máxima que pode ser permitida a cuidadores ou pessoas que oferecem conforto a um paciente injetado submetido a terapia com radiofármacos é de 1 mSv por ano, o mesmo limite aplicado ao público em geral.
- (C) Para pacientes que receberam I-131, o risco de contaminação interna de seus cuidadores/familiares adultos, particularmente por saliva, é a via de dose mais crítica, uma vez que a irradiação externa é facilmente mitigada pela distância.
- (D) O princípio de limitação de dose é aplicado rigorosamente à exposição do paciente que se submete à terapia com radionuclídeos não selados, devendo ser o principal critério para a decisão de sua alta hospitalar.
- (E) A dose para pessoas próximas de pacientes tratados com I-131 é predominantemente resultado da irradiação externa, sendo a contaminação um risco muito importante a ser evitado, especialmente para crianças pequenas e mulheres grávidas.

22. Observe a imagem abaixo, que apresenta três diferentes séries de um exame de PET-TC.



Fonte: IAEA Pub1617 (2014).

O artefato visualizado na série de PET central (segunda linha, indicado pela seta) foi gerado pela

- (A) correção de atenuação.
- (B) correção de espalhamento.
- (C) correção de eventos aleatórios.
- (D) correção de perda de contagens.
- (E) movimentação do paciente.

23. Considere as afirmações abaixo sobre o escopo da garantia da qualidade (QA, do inglês *Quality Assurance*) em serviços de medicina nuclear.

- I - Exige a implementação de um programa de treinamento e desenvolvimento contínuo de pessoal, incluindo a realização periódica de avaliações de desempenho.
- II - Abrange a definição e revisão periódica dos níveis de referência de diagnóstico.
- III- Inclui a gestão de não conformidades, exigindo o registro de incidentes e a realização de análises de causa-raiz para definir ações corretivas e preventivas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

24. Sobre o sinograma de aquisições de SPECT, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o sinograma é uma matriz bidimensional que organiza os valores de contagem, onde as coordenadas dos eixos representam a posição da projeção (distância radial) e o ângulo de rotação do detector.
- (B) a curva de dados gerada pela projeção de uma fonte pontual isolada descreve uma onda senoidal perfeita no sinograma, propriedade que confere o nome a essa matriz.
- (C) problemas de alinhamento do sistema, como erros no Centro de Rotação (COR), são identificados no sinograma de SPECT porque causam desvios ou padrões não sinusoidais nos dados de projeção.
- (D) o movimento do paciente durante a aquisição de SPECT manifesta-se no sinograma como linhas retas de intensidade atípica paralelas ao eixo angular.
- (E) a inspeção visual dos dados no formato de sinograma é uma etapa recomendada para revisar os dados de projeção antes da avaliação das imagens reconstruídas, pois permite a identificação da presença e do grau de movimento do paciente ou outros artefatos.

25. Leia o seguinte trecho, de acordo com a publicação IAEA STI/PUB/1198 (2008):

A dosimetria em procedimentos terapêuticos de medicina nuclear é realizada para permitir a determinação da dose _____ recebida pelos órgãos críticos, o cálculo da atividade _____ que pode ser administrada e o cálculo da dose absorvida _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) absorvida – segura – pelo tumor
- (B) efetiva – máxima – pela medula óssea
- (C) equivalente – otimizada – pelo tecido saudável
- (D) absorvida – restrita – pelo órgão-alvo
- (E) máxima – terapêutica – pelo sangue