Publicado em
12/01/2026

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 06/2025
DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 71

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Internação Clínica Adulto)

01.	D	11.	C	21.	A
02.	E	12.	E	22.	C
03.	B	13.	D	23.	B
04.	E	14.	ANULADA	24.	E
05.	E	15.	C	25.	C
06.	B	16.	B		
07.	E	17.	A		
08.	D	18.	D		
09.	B	19.	E		
10.	B	20.	D		

CADERNO DE QUESTÕES

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 06/2025

DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Médio

PS 71 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Internação Clínica Adulto)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

O segredo é começar, não esperar.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: ___ ___ ___ ___ ___ ___ – ___

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE FAURGS SETOR DE CONCURSOS

SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO FAURGS SETOR DE CONCURSOS

INSTRUÇÕES

FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

1. Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.

2. Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.

3. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.

4. Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.

5. O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame**, **portar relógios,** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *pagers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos/próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)

6. **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, réguas, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)

7. Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)

8. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.

9. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.

10. A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.

11. **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**

12. **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)

13. Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)

14. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

Boa prova!

01. De acordo com Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o dever do Estado de _____ a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e _____ que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e _____ às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

(A) promover – sanitárias – individualizado
(B) garantir – sanitárias – igualitário
(C) promover – sociais – individualizado
(D) garantir – sociais – igualitário
(E) promover – sociais – igualitário

02. São objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora os apresentados abaixo, **EXCETO** um. Assinale-o.

(A) Identificação das atividades produtivas da população trabalhadora e das situações de risco à saúde dos trabalhadores no território.
(B) Identificação de necessidades, demandas e problemas de saúde dos trabalhadores no território.
(C) Realização da análise da situação de saúde dos trabalhadores.
(D) Intervenção nos processos e ambientes de trabalho.
(E) Controle e avaliação da qualidade dos serviços e programas de saúde do trabalhador, especialmente nas instituições e empresas públicas.

03. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as descrições dos resíduos em saúde elencados na RDC nº 222, de 28 de março de 2018, com o grupo correspondente.

(1) Resíduos de serviços de saúde do Grupo A.
(2) Resíduos de serviços de saúde do Grupo B.
(3) Resíduos de serviços de saúde do Grupo C.
(4) Resíduos de serviços de saúde do Grupo D.
(5) Resíduos de serviços de saúde do Grupo E.

( ) Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
( ) Rejeitos radioativos.
( ) Resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
( ) Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.
( ) Resíduos perfurocortantes ou escarificantes.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

(A) 2 – 5 – 3 – 4 – 1.
(B) 4 – 3 – 2 – 1 – 5.
(C) 2 – 1 – 3 – 4 – 5.
(D) 4 – 5 – 2 – 1 – 3.
(E) 1 – 5 – 2 – 3 – 4.

04. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre recomendações e aspectos relevantes na administração de medicamentos por hipodermóclise.

( ) O índice de absorção é semelhante à intramuscular, com menor desconforto local.
( ) Os eventos adversos nessa via são frequentes e estão relacionados a infecção e trombose.
( ) É uma via parenteral de eleição para pacientes em cuidados paliativos que não podem receber medicamentos por via oral.
( ) A diluição dos medicamentos por hipodermóclise seguem os mesmos critérios da administração de medicamentos por via intravenosa.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A) F – V – V – V.
(B) V – V – V – F.
(C) V – F – F – V.
(D) F – F – F – V.
(E) V – F – V – F.

05. Considere os seguintes medicamentos.

I - Atenolol
II - Losartana
III- Nifedipino
IV - Nitroprussiato de sódio

Quais são medicamentos do grupo farmacológico anti-hipertensivos?

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) I, II, III e IV.

06. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), dado pessoal se refere a qualquer informação de uma pessoa física. A lei prioriza a proteção individual e assegura que dados pessoais sejam utilizados com cuidado e segurança. O objetivo é prevenir o uso errado desses dados, proteger a privacidade e a liberdade das pessoas e promover um ambiente de respeito às informações pessoais. A lei trata com especial cuidado os dados pessoais sensíveis, que incluem informações íntimas como

(A) endereço eletrônico (e-mail).
(B) origem racial, crenças religiosas, convicção política, filiação a sindicatos.
(C) número de CNH e placa de automóvel.
(D) CPF e data de nascimento.
(E) número de identificação do Sistema Único de Saúde (SUS).

07. Ao realizar o banho no leito em um paciente adulto totalmente dependente, qual procedimento de segurança e técnica deve ser priorizado pelo técnico de enfermagem para garantir a dignidade, o conforto e a proteção do paciente?

(A) Manter a temperatura da água entre 50 e 60 °C para garantir a melhor remoção da oleosidade da pele.
(B) Iniciar a higienização pelas áreas mais contaminadas (períneo e região anal), movendo-se progressivamente para as áreas menos contaminadas (face e membros superiores).
(C) Realizar movimentos de fricção vigorosa com a toalha durante a secagem para estimular a circulação periférica do paciente.
(D) Utilizar somente sabão degermante antisséptico em todo o corpo, mesmo em pacientes sem indicação clínica para tal, a fim de reduzir a carga bacteriana cutânea.
(E) Isolar o paciente (com biombos ou fechando a porta) e manter as partes do corpo que não estão sendo lavadas cobertas, visando ao sigilo, à privacidade e à manutenção da temperatura corporal.

08. A Lei nº 7.498/1986, que regulamenta o exercício profissional da Enfermagem, e a Resolução COFEN nº 564/2017 (Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem) estabelecem as responsabilidades e os limites de atuação do Técnico de Enfermagem. Considerando o Código de Ética, qual das alternativas abaixo apresenta um direito fundamental do Técnico de Enfermagem que visa a resguardar a segurança do paciente, do próprio profissional e a qualidade da assistência?

(A) Assumir a chefia do serviço de enfermagem em unidades de internação de baixa complexidade, desde que o enfermeiro responsável esteja em período de férias.
(B) Registrar no prontuário informações parciais sobre o paciente, quando a jornada de trabalho for superior a seis horas, devido à sobrecarga operacional.
(C) Realizar a consulta de enfermagem e prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública, mediante protocolo aprovado pela instituição.
(D) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que ofereçam risco à vida, à saúde e à segurança da pessoa, família ou coletividade.
(E) Suspender de imediato as atividades laborais quando houver indícios de condições inseguras de trabalho, sem a necessidade de comunicação prévia à chefia imediata ou ao COREN.

09. A quimioterapia e a radioterapia podem causar mucosite, uma reação inflamatória e ulcerativa da mucosa oral e do trato gastrointestinal. Em pacientes oncológicos, a mucosite oral é uma complicação dolorosa que interfere na nutrição e aumenta o risco de infecções sistêmicas. Com base nas recomendações de cuidados de enfermagem para manejo da mucosite oral, qual das seguintes orientações ou procedimentos deve ser evitado pelo técnico de enfermagem ao planejar a higiene oral do paciente?

(A) Utilizar escova de dentes com cerdas macias ou ultrassuaves e substituí-las regularmente.
(B) Recomendar o uso de enxaguantes bucais à base de álcool e glicerina ou bochechos com o suco do limão para estimular a salivação e a cicatrização das úlceras.
(C) Orientar o paciente a consumir alimentos macios, frios ou em temperatura ambiente, evitando alimentos ácidos ou condimentados.
(D) Oferecer gargarejos com solução salina isotônica suave (água e sal) ou bicarbonato de sódio a cada 2 a 4 horas.
(E) Inspecionar diariamente a cavidade oral do paciente, registrando o grau de lesão e a presença de placas ou exsudato (secreção).

10. De acordo com os princípios e a filosofia dos cuidados paliativos, qual é o foco principal da atuação da equipe de saúde, incluindo o técnico de enfermagem, no cuidado a pacientes que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida?

(A) Priorizar a cura da doença primária por meio de terapias intensivas e procedimentos invasivos, buscando a todo custo a extensão máxima da sobrevida.
(B) Promover a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares por meio de prevenção e alívio do sofrimento, abordando o controle da dor e outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual.
(C) Concentrar-se exclusivamente no apoio emocional e espiritual do paciente, delegando o controle da dor e dos sintomas físicos a outras áreas da medicina.
(D) Suspender imediatamente todos os tratamentos modificadores da doença, focando apenas em hidratação e nutrição artificiais até o momento da morte.
(E) Limitar a assistência aos pacientes que estão na fase terminal imediata (últimas 48 horas de vida), pois, antes disso, o foco é estritamente curativo.

11. A higiene das mãos (HM) é um dos pilares da prevenção de infecções, sendo uma das mais importantes estratégias de precaução padrão disponível. Assinale a alternativa que contenha a ordem correta dos "5 momentos para a higiene das mãos" preconizados pela Organização Mundial de Saúde.

(A) 1. Após tocar superfícies próximas ao paciente.
2. Antes de realizar procedimento limpo/asséptico.
3. Antes de tocar o paciente.
4. Após risco de exposição a fluidos corporais.
5. Após tocar o paciente.

(B) 1. Antes de realizar procedimento limpo/asséptico.
2. Após tocar superfícies próximas ao paciente.
3. Após risco de exposição a fluidos corporais.
4. Antes de tocar o paciente.
5. Após tocar o paciente.

(C) 1. Antes de tocar o paciente.
2. Antes de realizar procedimento limpo/asséptico.
3. Após risco de exposição a fluidos corporais.
4. Após tocar o paciente.
5. Após tocar superfícies próximas ao paciente.

(D) 1. Após risco de exposição a fluidos corporais.
2. Após tocar superfícies próximas ao paciente.
3. Antes de tocar o paciente.
4. Antes de realizar procedimento limpo/asséptico.
5. Após tocar o paciente.

(E) 1. Após tocar o paciente.
2. Antes de realizar procedimento limpo/asséptico.
3. Antes de tocar o paciente.
4. Após risco de exposição a fluidos corporais.
5. Após tocar superfícies próximas ao paciente.

12. A doença causada por *Clostridioides difficile* é uma doença grave resultante da infecção da superfície interna do cólon. A bactéria produz toxinas que causam inflamação no cólon e, em alguns casos mais graves, pode levar à morte. *Clostridioides difficile* é a maior causa de diarreia nosocomial entre adultos nos países industrializados e está associado com morbidade significativa, particularmente entre pacientes com idade maior que 65 anos.

De acordo com a afirmação acima, analise as frases abaixo em relação às medidas específicas para prevenção e controle de infecções por *Clostridioides difficile* e assinale-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

( ) Incentivar os pacientes a lavar as mãos e a tomar banho para reduzir a carga de esporos na pele.
( ) Acomodar pacientes com *Clostridioides difficile* em quarto privativo com um banheiro exclusivo não irá diminuir a transmissão para outros pacientes.
( ) É preferível que a higiene das mãos seja realizada com água e sabonete líquido. Essa medida é recomendada para remover os esporos das mãos, já que os mesmos não são eliminados com o uso de preparação alcoólica, e deve ser realizada sempre que houver contato com o paciente e/ou o ambiente, visto que é frequente a contaminação da pele e a eliminação ambiental de *Clostridioides difficile*.
( ) Se for necessário o compartilhamento de quartos, recomenda-se não agrupar pacientes com *Clostridioides difficile* e pacientes com outros microrganismos multirresistentes, como *Staphylococcus aureus e Enterococo.*
( ) Em situações de surto, pacientes com suspeita de *Clostridioides difficile* devem ser colocados em precauções de contato preventivas até a chegada dos resultados do teste dessa bactéria.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A) V – F – V – F – F.
(B) V – V – F – V – V.
(C) F – V – V – V – F.
(D) F – V – F – F – V.
(E) V – F – V – V – V.

13. Isolar o paciente em um quarto privativo com a porta sempre fechada, usar máscara de proteção respiratória (PFF2 ou N95) ao entrar no quarto, higienizar as mãos, ventilar adequadamente o ambiente, com sistema de pressão negativa se possível, evitar o transporte do paciente e, quando necessário, garantir que ele use máscara cirúrgica.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome da doença que exige as medidas acima citadas.

(A) Sífilis.
(B) Hepatite C.
(C) HIV.
(D) Tuberculose.
(E) Malária.

14. Analise o trecho abaixo.

Precaução _____ deve ser seguida por todos os _____, independentemente da suspeita ou não de _____. Podemos citar higiene de mãos, uso de luvas e avental, óculos e máscara nessa precaução.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

(A) para gotículas – profissionais – infecções
(B) padrão – pacientes – infecções
(C) sistêmica – familiares – influenza
(D) de contato – médicos – Covid-19
(E) para gotículas – familiares – infecções

15. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação aos cuidados com preparo e administração de medicamentos.

(A) Higienizar as mãos antes de acessar materiais/suprimentos, frascos de medicamentos e soluções intravenosas e durante preparo e administração de medicamentos.
(B) Utilizar técnica asséptica em todos os aspectos da utilização de frasco de medicamento, preparação e administração de medicamentos parenterais.
(C) Transportar seringas de medicamentos em bolsos ou roupas.
(D) Frascos de medicamentos multidoses utilizados por mais de um paciente devem ser armazenados e rotulados de forma adequada e não devem entrar na área de atendimento imediato ao paciente.
(E) Nunca utilizar uma seringa para mais de um paciente, mesmo se a agulha tiver sido trocada entre pacientes.

16. De acordo com o Decreto nº 1.171, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale um dever do servidor público.

(A) Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
(B) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem for de direito.
(C) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
(D) Desviar servidor público para atendimento a interesse particular.
(E) Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana.

17. Sobre os cuidados no preparo e na administração de medicamentos, qual a afirmativa correta?

(A) A desinfecção das vias do cateter deve ser realizada com fricção com álcool a 70%, sempre antes e após a cada manipulação.
(B) Os equipos de soro devem ser irrigados com 10 ml de soro fisiológico após a infusão de medicamentos.
(C) A dupla checagem não é recomendada em medicamentos de alta vigilância.
(D) A desinfecção da tampa de borracha do frasco-ampola com álcool 70% é opcional.
(E) Agulhas devem permanecer inseridas na tampa de borracha do frasco-ampola de múltiplas doses.

18. Um paciente tem, em sua prescrição, vancomicina 1.000 mg via endovenosa para ser administrada em 2 horas, de 12/12 horas. A farmácia do hospital dispõe da vancomicina 500 mg acompanhada de 10 mL de água destilada como diluente. Quantos mL serão necessários aspirar para ter a dose prescrita, após a reconstituição?

(A) 5 mL
(B) 10 mL
(C) 15 mL
(D) 20 mL
(E) 25 mL

19. Qual das alternativas abaixo **NÃO** é um dos fatores intrínsecos na avaliação multifatorial do risco de queda?

(A) Sedentarismo.
(B) Distúrbio de marcha e equilíbrio.
(C) Declínio cognitivo.
(D) Condições ortopédicas.
(E) Órteses inadequadas.

20. A identificação correta do paciente é indispensável para garantir a qualidade e a segurança nos serviços de saúde. Os identificadores recomendados para serem utilizados na identificação dos pacientes são

(A) nome e número do quarto.
(B) data de nascimento e número do quarto.
(C) nome e diagnóstico.
(D) nome e data de nascimento.
(E) data de nascimento e diagnóstico.

21. Os _____ associados ao uso terapêutico de medicamentos podem ser classificados em erros de _____, dispensação e _____. Em instituições hospitalares, a ocorrência de erros é frequente.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

(A) erros – prescrição – administração
(B) eventos adversos – diagnóstico – comunicação
(C) erros – diagnóstico – prescrição
(D) erros – comunicação – diagnóstico
(E) eventos adversos – prescrição – administração

22. Considerando a portaria n° 2.528, de 19 de outubro de 2006, analise as questões a seguir e assinale-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

( ) A maior causa de mortalidade entre idosos brasileiros é o infarto agudo do miocárdio.
( ) Indivíduos idosos, mesmo sendo independentes, mas que apresentem alguma dificuldade nas atividades instrumentais de vida diária, tais como preparar refeições, controlar a própria medicação, fazer compras, controlar o próprio dinheiro, usar o telefone, fazer pequenas tarefas e reparos domésticos e sair de casa sozinho utilizando uma condução coletiva, são considerados idosos com potencial para desenvolver fragilidade e, por isso, merecem atenção específica dos profissionais de saúde e devem ser acompanhados com maior frequência.
( ) Incapacidade funcional e limitações físicas, cognitivas e sensoriais são consequências inevitáveis do envelhecimento.
( ) Envelhecimento bem-sucedido pode ser entendido a partir de seus três componentes: menor probabilidade de doença, alta capacidade funcional física e mental e engajamento social ativo com a vida.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A) F – F – V – V.
(B) F – V – F – F.
(C) F – V – F – V.
(D) V – F – V – V.
(E) V – F – F – F.

23. Na atenção à saúde, a segurança é um princípio básico e um requisito para a qualidade do cuidado. A segurança do paciente é definida como a redução do risco de danos desnecessários associados à atenção à saúde, até um mínimo aceitável, pois, considerando-se a complexidade de procedimentos e tratamentos, o potencial para o dano é real. O cuidado seguro resulta tanto de ações corretas dos profissionais de saúde, como de processos e sistemas adequados nas instituições e serviços, assim como de políticas governamentais regulatórias, exigindo um esforço coordenado e permanente.

Com base no texto acima, assinale a alternativa correta.

(A) É recomendado adotar institucionalmente pelo menos dois identificadores para o paciente, sendo o nome e o número do quarto os mais seguros.
(B) A comunicação ineficaz está entre as causas-raízes de mais de 70% dos erros na atenção à saúde. Interrupções na comunicação ou falta de trabalho em equipe são fatores que contribuem para a ocorrência de eventos adversos e resultados insatisfatórios de tratamentos.
(C) O uso de luvas estéreis substitui a necessidade de higienização das mãos e diminui o risco de infecções de pacientes hospitalizados.
(D) A utilização de escalas de avaliação de risco substitui a avaliação clínica sistemática dos profissionais.
(E) Na dupla checagem, não é necessário que o profissional solicite ao paciente ou acompanhante que verbalize os seus dados identificadores.

24. A insulina tem a função de diminuir o nível de glicemia depois das refeições, facilitando a captação e a utilização da glicose pelas células musculares, adiposas e hepáticas. Na ausência da insulina adequada, o tratamento farmacológico torna-se essencial. Com base nessa informação, analise as afirmações a seguir e assinale-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

( ) A lispro possui tempo de ação intermediária e é geralmente administrada depois da alimentação.
( ) A glargina, utilizada para dose basal, tem uma duração de 24 horas.
( ) A NPH tem início entre 2 e 4 horas e é geralmente administrada de 20 a 30 minutos antes de uma refeição.
( ) A regular possui tempo de ação curto e pode ser administrada isoladamente ou em associação a uma insulina de ação mais longa.
( ) As principais regiões para aplicação de insulina são: abdome, braços, coxas e quadris. A absorção é mais rápida no abdome e diminui progressivamente no braço, na coxa e no quadril, respectivamente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

(A) F – F – F – V – V.
(B) V – F – V – F – F.
(C) F – F – V – F – V.
(D) V – V – F – F – F.
(E) F – V – F – V – V.

25. O cloreto de potássio pertence ao grupo farmacológico dos eletrólitos, sendo indicado para o tratamento da hipocalemia e podendo ser administrado por via oral, via sonda nasoentérica e via endovenosa. Com base nessa afirmação, escolha a alternativa correta.

(A) Os principais efeitos colaterais relacionados à administração de cloreto de potássio são constipação e taquicardia.
(B) Para garantir a segurança do paciente e a sua eficácia, deve ser administrado sem diluir ou em *bolus*.
(C) Pode ser administrado com alimentos ou líquidos para diminuir a irritação gástrica.
(D) Deve-se evitar uma infusão lenta para prevenir a dor e a flebite.
(E) O uso concomitante com escopolamina evita lesões gastrointestinais.