



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 07/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 59 - MÉDICO I (Controle de Infecção Hospitalar)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Parece que o vento mania o tempo.



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, réguas, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. Para o critério de infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) laboratorial, em crianças > 28 dias e < 1 ano, é necessário ter duas ou mais hemoculturas (em diferentes punções com intervalo máximo de 48h) com contaminante comum de pele, e, pelo menos, qual dos seguintes sinais ou sintomas?

- (A) Hipotermia.
- (B) Hipotensão (pressão sistólica – 90mmHg).
- (C) Oligúria (volume urinário <20mL/h).
- (D) Tremores.
- (E) Sonolência.

02. O tempo mínimo de ventilação mecânica para diagnosticar uma pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é

- (A) 12 horas.
- (B) 24 horas.
- (C) 28 horas.
- (D) 36 horas.
- (E) 48 horas.

03. Assinale a alternativa que descreve a medida de prevenção correta de IPCS relacionada a cateter central.

- (A) Utilizar campo estéril ampliado, de forma a cobrir o corpo todo do paciente (cabeça aos pés).
- (B) Realizar desinfecção das conexões, conectores valvulados e *ports* de adição de medicamentos com solução antisséptica à base de gliconato de clorexidina.
- (C) Remover os pelos, quando necessário, utilizando lâminas de barbear.
- (D) Realizar troca pré-programada dos cateteres centrais.
- (E) Realizar a troca da cobertura com gaze e fita adesiva estéril a cada três dias, e a troca da cobertura estéril transparente a cada 15 dias.

04. Para a prevenção de PAVM,

- (A) a cabeceira do paciente precisa ficar com inclinação de até 20 graus.
- (B) não é recomendada a troca rotineira do circuito respiratório.
- (C) deve-se manter pressões do balonete maiores que 22 mmHg ou 30 cmH₂O.
- (D) deve-se trocar o sistema fechado de aspiração uma vez por semana.
- (E) deve-se adequar, semanalmente, o nível de sedação e o teste de respiração espontânea.

05. A afirmativa "Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos das mãos do profissional para o paciente, incluindo os microrganismos do próprio paciente, e que podem causar infecção" (ANVISA, 2021) relaciona-se a qual dos momentos de higiene de mãos, preconizados pela Organização Mundial de Saúde?

- (A) Momento 1 – antes do contato com o paciente.
- (B) Momento 2 – antes da realização de procedimento asséptico.
- (C) Momento 3 – após risco de exposição a fluidos corporais.
- (D) Momento 4 – após contato com o paciente.
- (E) Momento 5 – após contato com áreas próximas ao paciente.

06. A resolução RDC nº15, de 15 de março de 2012, dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Com relação a essa resolução, considere o texto abaixo.

"O centro de material e esterilização (CME) _____ é aquele que realiza processamento de produtos para saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, passíveis de processamento. O serviço de saúde que realize mais de quinhentas cirurgias/mês, excluindo partos, deve constituir um Comitê de Processamento de Produtos para Saúde, composto, minimamente, por um representante: da diretoria do serviço de saúde, responsável pelo CME, do serviço de enfermagem, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e _____. Deve ser realizada qualificação de instalação, qualificação de operação e qualificação de desempenho, para os equipamentos utilizados na limpeza automatizada e na esterilização de produtos para saúde, com periodicidade mínima _____."

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente as lacunas do parágrafo acima.

- (A) classe I – da administração do serviço de saúde – anual
- (B) classe I – da equipe médica – anual
- (C) classe II – da administração do serviço de saúde – semestral
- (D) classe II – da equipe médica – semestral
- (E) classe III – da administração do serviço de saúde – semestral

07. São fatores de risco maternos para as infecções neonatais relacionadas à assistência à saúde (IRAS) precoce, de provável origem materna, os abaixo listados, **EXCETO** um deles. Assinale-o.

- (A) Infecção materna do trato gastrointestinal sem tratamento ou em tratamento.
- (B) Colonização pelo estreptococo B em gestante, sem quimioprofilaxia intraparto, quando indicada.
- (C) Trabalho de parto em gestação menor que 37 semanas.
- (D) Procedimentos de medicina fetal nas últimas 72 horas.
- (E) Febre materna nas últimas 48 horas.

08. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre infecção por *Bordetella sp.*

- (A) *Bordetella pertussis* é o cocobacilo gram-negativo causador da coqueluche.
- (B) Além da *B. pertussis*, a *Bordetella parapertussis* e a *Bordetella bronchiseptica* também causam doenças respiratórias em humanos.
- (C) A introdução da vacina, na década de 1940, diminuiu de forma muito importante a incidência de coqueluche no mundo todo.
- (D) O diagnóstico de coqueluche é fundamentalmente laboratorial, através de cultura ou PCR da secreção nasofaríngea. Não é utilizado critério clínico e epidemiológico para esse fim.
- (E) Tanto o tratamento da coqueluche, quanto a quimioprofilaxia, podem ser realizados com macrolídeos, como a eritromicina e a azitromicina.

09. Assinale a alternativa correta em relação às polimixinas.

- (A) A polimixina B tem apresentação para uso tópico e também para uso parenteral (exclusivamente por via endovenosa).
- (B) Uma grande porção da polimixina B, administrada por via endovenosa, é excretada na forma inalterada por via urinária.
- (C) Para tratamento de meningite causada por microorganismos gram-negativos, a polimixina B pode ser administrada por via intratecal.
- (D) As polimixinas são ativas contra uma grande quantidade de bacilos gram-negativos, e também contra alguns cocos gram-negativos.
- (E) Terapia inalatória com colistimetato (polimixina E) não deve ser utilizada nos pacientes portadores de fibrose cística, devido à ineficácia já comprovada.

10. Considere os efeitos colaterais abaixo.

- I - Cefaleia
- II - Mielossupressão
- III - Diarreia
- IV - Neuropatia periférica

Quais são observados em pacientes que recebem tratamento com linezolida por via oral ou parenteral?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

11. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os métodos diagnósticos de infecções bacterianas às suas características.

- (1) Microscopia
 - (2) Cultura
 - (3) Detecção de antígenos bacterianos
 - (4) Detecção de anticorpos direcionados contra o microorganismo
- () Utiliza diversos meios para estimular crescimento das bactérias *in vitro*.
 - () Detecta bactérias através de colorações diferenciais e fluorescentes.
 - () Usado para confirmar infecções cujas bactérias causadoras são difíceis de cultivar.
 - () Tem a vantagem de ser de realização rápida e de baixo custo, mas, em geral, de baixa sensibilidade.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 4 – 3.
- (B) 2 – 3 – 4 – 1.
- (C) 3 – 2 – 4 – 1.
- (D) 2 – 3 – 1 – 4.
- (E) 3 – 2 – 1 – 4.

12. Assinale a opção que contém apenas antimicrobianos ativos contra o complexo *Mycobacterium avium* (*Mycobacterium avium complex*).

- (A) Claritromicina e pirazinamida.
- (B) Isoniazida e etambutol.
- (C) Rifampicina e etambutol.
- (D) Clofazimina e rifabutina.
- (E) Azitromicina e terizidona.

13. Considere as afirmações abaixo, sobre o tratamento da tuberculose.

- I - Os fármacos para tratamento da tuberculose só atuam quando há atividade metabólica, ou seja, bacilos em estado de latência não são atingidos pelos medicamentos, mas são destruídos pelo sistema imunológico.
- II - Os fármacos utilizados para tratamento da tuberculose com maior atividade bactericida precoce são isoniazida, estreptomicina e rifampicina.
- III- A pirazinamida é bacteriostática e é estrategicamente associada aos medicamentos mais potentes para prevenir a emergência de bacilos resistentes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

14. Avalie as afirmações abaixo com relação à higienização das mãos.

- I - Os álcoois têm rápida ação microbicida, quando aplicados à pele, com atividade residual apreciável.
- II - A recolonização bacteriana na pele ocorre lentamente após o uso de antisséptico à base de álcool nas mãos.
- III- A maioria das soluções para a antisepsia de mãos à base de álcool contém etanol (álcool etílico), ou isopropanol (álcool isopropílico), ou n-propanol, ou ainda uma combinação de dois desses produtos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas I e II.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

15. Em relação à higiene de mãos em serviços de saúde, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, associando o produto/substância à sua característica/finalidade.

- (1) Emoliente
 (2) Desnaturante
 (3) Preparação alcoólica específica para fricção cirúrgica das mãos
 (4) Clorexidina 2%
- () Tem a finalidade de conferir sabor amargo à preparação alcoólica, a fim de evitar a ingestão acidental por crianças ou mau uso por pacientes.
 () Antisséptico degermante utilizado no preparo pré-operatório das mãos.
 () Sua presença na formulação tem o objetivo de evitar o ressecamento e a irritação das mãos.
 () Deve apresentar efeito imediato e atividade persistente e sustentada devidamente documentada.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 4 – 3.
 (B) 1 – 3 – 2 – 4.
 (C) 1 – 4 – 2 – 3.
 (D) 2 – 3 – 1 – 4.
 (E) 2 – 4 – 1 – 3.

16. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta produto ou substância utilizada no processamento de produtos para a saúde.

- (A) Acetonitrila
 (B) Detergente enzimático
 (C) Ortoftaldeído
 (D) Óxido de etileno
 (E) Plasma de peróxido de hidrogênio

17. *Clostridioides difficile* (antigamente *Clostridium difficile*) tem ganhado relevância no contexto mundial devido ao aumento de sua incidência e ao surgimento de uma cepa considerada mais letal. Diversas barreiras devem ser criadas para o controle da disseminação desse microrganismo. Com relação a esse tema, analise as afirmações abaixo.

- I - A contaminação ambiental de quartos com carpete são maiores que a de quartos sem carpete, quando ocupados por pacientes com *C. difficile*.
- II - Esporos são menos resistentes que células vegetativas aos desinfetantes (não clorados) habitualmente utilizados na desinfecção de superfícies fixas.
- III- É recomendado o uso de soluções de hipoclorito para a desinfecção de ambientes com pacientes portadores de *C. difficile*.
- IV- Produto desinfetante contendo ácido peracético como princípio ativo é capaz de inativar de forma confiável esporos *C. difficile*.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas I, III e IV.

18. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação ao processo de limpeza e desinfecção ambiental no contexto hospitalar.

- (A) Superfícies são consideradas itens não críticos devido ao seu contato com a pele íntegra.
- (B) É imperativo o uso de desinfetantes no piso de quartos de isolamento de pacientes com doenças infectocontagiosas.
- (C) A classe de desinfetantes utilizados na desinfecção ambiental e na desinfecção de equipamentos médicos pode ser semelhante.
- (D) Um aumento no pH melhora a atividade de desinfetante à base de quaternário de amônio.
- (E) A matéria orgânica presente no ambiente reduz a atividade germicida do desinfetante à base de hipoclorito.

19. Em relação ao processo de higienização das mãos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A higienização das mãos deve ser realizada com água e sabonete quando as mãos estiverem visivelmente sujas.
- (B) As preparações com gluconato de clorexidina a 2% não apresentam diferenças significativas de atividade antimicrobiana, comparadas àquelas contendo 4% de clorexidina.
- (C) O principal problema da higienização das mãos não é a falta de bons produtos, mas sim, a negligência dessa prática.
- (D) A qualidade da água utilizada em serviços de saúde é fundamental para as práticas de higienização das mãos. Os reservatórios de água devem ser limpos e desinfetados com realização de controle microbiológico semestral.
- (E) Os álcoois têm rápida ação microbicida, quando aplicados à pele, com atividade na presença de matéria orgânica.

20. Com base na Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), considere as afirmações abaixo.

- I - Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura sem contato manual.
- II - A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infectocontagiosas e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico deve ser de responsabilidade do empregador.
- III- Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte, após o reencepe e a desconexão manual de agulhas.
- IV - O recipiente para acondicionamento dos perfurocortantes deve ser mantido em suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

21. Considere as afirmações abaixo com relação ao atendimento de pacientes com suspeita e/ou confirmação de infecção por coronavírus.

- I - O uso de dois pares de luvas sobrepostos está claramente relacionado a menores taxas de contaminação dos profissionais de saúde e deve ser recomendado em locais sem restrições no fornecimento de equipamentos de proteção.
- II - Para procedimentos geradores de aerossóis em pacientes com infecção suspeita ou confirmada por coronavírus, está indicado o uso de máscara N95.
- III - Para procedimentos não geradores de aerossóis é facultativo o uso de máscara N95, protetor ocular e luvas.
- IV - As máscaras N95 devem passar por teste de vedação para garantir a máxima proteção durante seu uso.

Quais são medidas corretas de prevenção para transmissão da infecção em ambiente hospitalar?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

22. Considere as alternativas abaixo com relação às medidas para diminuir o risco de infecções fúngicas ambientais em pacientes com transplante recente de células tronco hematopoiéticas e assinale-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Manter o paciente o maior tempo no quarto e utilizar proteção respiratória de alta eficiência (como exemplo máscara N95) quando sair do ambiente protegido em períodos de obras e reformas.
- () Uso obrigatório de avental e luvas por profissionais e acompanhantes para contatos com o paciente.
- () Utilização de filtro HEPA no ambiente de internação, bem como pressão positiva com relação ao corredor.
- () Proibir o uso de vasos de plantas e flores no quarto do paciente ou áreas de espera.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – V.
- (B) F – V – V – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – F – V – V.
- (E) V – F – F – V.

23. Assinale a alternativa correta com relação à transmissão de agentes infecciosos em instituições de saúde.

- (A) Pacientes com sarampo devem permanecer em medidas de precauções padrão e por gotículas, por quatro dias, após o início da erupção cutânea (com o início da erupção considerado no dia zero).
- (B) Pacientes imunocomprometidos com sarampo devem permanecer em medidas de precauções padrão e por aerossóis por 14 dias, devido à disseminação prolongada do vírus nesses indivíduos.
- (C) Pacientes com caxumba devem permanecer em medidas de precaução padrão e por gotículas, por quatro dias após o intumescimento das parótidas.
- (D) Pacientes com coqueluche devem permanecer em medidas de precaução padrão e por gotículas, por sete dias após o início da terapia antimicrobiana efetiva.
- (E) Lactentes e com suspeita de bronquiolite devem permanecer em medidas de precaução padrão e de contato por toda a duração da doença.

24. Considere as afirmações abaixo.

- I - Os resíduos dos serviços de saúde classificados como do Grupo B (resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade) que não precisam ser obrigatoriamente tratados, e os resíduos após o tratamento são considerados rejeitos e devem ser acondicionados em saco branco leitoso.
- II - O coletor do saco para acondicionamento dos resíduos dos serviços de saúde deve ser de material liso, lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados; o coletor não necessita de tampa para fechamento sempre que ocorre a substituição imediata do saco para acondicionamento após a realização de cada procedimento.
- III- Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, gorros e máscaras descartáveis, resto alimentar de paciente, material utilizado em antisepsia e hemostasia de venóclises, luvas de procedimentos que não entraram em contato com sangue ou líquidos corpóreos, equipo de soro, abaixadores de língua são classificados como do Grupo D e podem ser equiparados a resíduos domiciliares.
- IV- O abrigo externo de resíduos deve ter, no mínimo, um ambiente para armazenar os coletores dos do Grupo A, podendo também conter os do grupo D, e outro ambiente exclusivo para armazenar os coletores de resíduos dos serviços de saúde do grupo E. Também deve ser construído com aberturas para ventilação e com tela de proteção contra acesso de vetores.

Quais estão corretas de acordo com a RDC nº 222, de 28 de março de 2018?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

25. Considere os seguintes procedimentos.

- I - Terapia antiviral deve ser iniciada para pacientes com suspeita ou infecção confirmada por *influenza* que estão internados e que tiveram início dos sintomas há, no máximo, quatro dias.
- II - Em gestantes e puérperas (até duas semanas pós-parto), independentemente do *status* vacinal, deve ser iniciada terapia antiviral, assim que possível.
- III- Em casos de surtos hospitalares de *influenza* os pacientes devem ser alocados em leitos com pressão negativa e instaladas medidas de precaução para aerossóis e contato.
- IV - Em períodos de circulação de *influenza* sazonal, deve ser pesquisado *influenza* em pacientes imunocomprometidos e de alto risco que se apresentam com doença semelhante à *influenza*, pneumonia ou doença respiratória inespecífica (por exemplo, tosse sem febre) se o resultado do teste for influenciar o manejo clínico.

Quais estão corretos com relação ao manejo da infecção por *influenza* sazonal?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 07/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 59

MÉDICO I (Controle de Infecção Hospitalar)

01.	A	11.	A	21.	C
02.	E	12.	ANULADA	22.	D
03.	A	13.	D	23.	ANULADA
04.	B	14.	D	24.	B
05.	B	15.	E	25.	C
06.	B	16.	A		
07.	A	17.	E		
08.	D	18.	B		
09.	C	19.	E		
10.	E	20.	D		