

# CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RS

**EDITAL N° 07/2023**

DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Médio

**PS 68 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM**  
(Neonatologia)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada

## ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

**Não há amargo mais doce que o do chimarrão.**

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição n°: \_\_\_\_\_

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.





## **EDITAL Nº 07/2023 DE PROCESSOS SELETIVOS**

### **GABARITO APÓS RECURSOS**

#### **PROCESSO SELETIVO 68**

#### **TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Neonatologia)**

01.	<b>C</b>	11.	<b>D</b>	21.	<b>A</b>	31.	<b>A</b>
02.	<b>E</b>	12.	<b>E</b>	22.	<b>E</b>	32.	<b>ANULADA</b>
03.	<b>ANULADA</b>	13.	<b>ANULADA</b>	23.	<b>A</b>	33.	<b>E</b>
04.	<b>B</b>	14.	<b>E</b>	24.	<b>D</b>	34.	<b>B</b>
05.	<b>E</b>	15.	<b>E</b>	25.	<b>C</b>	35.	<b>ANULADA</b>
06.	<b>C</b>	16.	<b>ANULADA</b>	26.	<b>E</b>	36.	<b>C</b>
07.	<b>A</b>	17.	<b>A</b>	27.	<b>B</b>	37.	<b>D</b>
08.	<b>E</b>	18.	<b>ANULADA</b>	28.	<b>C</b>	38.	<b>A</b>
09.	<b>C</b>	19.	<b>B</b>	29.	<b>D</b>	39.	<b>D</b>
10.	<b>C</b>	20.	<b>D</b>	30.	<b>ANULADA</b>	40.	<b>C</b>

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame**, portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, telefones celulares, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos/próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou determinadas em lei. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, réguas, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver, obrigatoriamente, ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**01.** Conforme texto do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um dever fundamental do servidor público.

- (A) Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos.
- (B) Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem.
- (C) Comunicar imediatamente a seus colegas de classe todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, sem haver necessidade de providências.
- (D) Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.
- (E) Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema.

**02.** Tendo em vista o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, considere as seguintes ações.

- I - Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam.
- II - Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
- III- Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.

Quais são vedadas ao servidor público?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**03.** Em concordância com a NR-32, qual das ações abaixo descritas o empregador deve vedar?

- (A) A utilização de pias de trabalho para fins diversos e aleatórios.
- (B) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato fora dos postos de trabalho.
- (C) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
- (D) A guarda de alimentos em locais destinados para este fim.
- (E) O uso de calçados fechados.

**04.** Em relação à reanimação cardiopulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) A ventilação e a massagem cardíaca são realizadas de forma sincrônica, mantendo-se uma relação de 2:1, ou seja, 2 movimentos de massagem cardíaca para 1 movimento de ventilação.
- (B) Utiliza-se a diluição de uma ampola de adrenalina (1 mg/mL) em 9 mL de SF 0,9% para administração da dose prescrita durante a reanimação cardiopulmonar.
- (C) Para compressões torácicas, aplicar os dois polegares sobrepostos no terço superior do esterno, ou seja, na linha intermamilar e poupando o apêndice xifoide. O restante das mãos circunda o tórax, dando suporte ao dorso durante a massagem cardíaca.
- (D) A profundidade da compressão deve englobar 1/2 da dimensão anteroposterior do tórax, de maneira a produzir um pulso palpável. É importante permitir a reexpansão de 1/3 da altura do tórax após a compressão para haver enchimento das câmaras ventriculares e das coronárias.
- (E) Após estabilização, o recém-nascido prematuro < 34 semanas precisa ser transferido do centro obstétrico à unidade neonatal em incubadora de transporte de parede simples ou berço comum.

**05.** Quanto aos procedimentos realizados em pacientes críticos na UTI Neonatal, analise as seguintes afirmativas.

- I - A intubação traqueal é realizada nos casos de indicação de ventilação mecânica e de administração de surfactante pulmonar.
- II - Durante a exsanguinotransfusão, é realizado registro dos volumes retirados e infundidos, assim como todas as intercorrências durante o procedimento.
- III- Pneumotórax é o acúmulo de ar no espaço pleural com colapso parcial ou total do pulmão afetado e pode ser classificado em assintomático, sintomático e hipertensivo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**06.** Para observar uma mamada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca pontos-chave sobre o posicionamento e pega adequados. Qual das instruções abaixo **NÃO** está de acordo com as orientações da OMS?

- (A) Aréola mais visível acima da boca do bebê.
- (B) Bebê com cabeça e tronco bem alinhados.
- (C) Rosto do bebê de frente para a mama, com queixo na altura do mamilo.
- (D) Bebê bem apoiado.
- (E) Queixo encostado na mama.

**07.** Em relação à proteção e promoção do aleitamento, assinale a alternativa correta.

- (A) O método canguru (contato pele a pele, vínculo e autonomia familiar, rede de apoio) é uma estratégia de promoção e proteção do aleitamento materno entre os recém-nascidos prematuros.
- (B) Os profissionais de saúde não devem inserir os pais e a rede de apoio nas questões relacionadas à amamentação, pois se trata de um cuidado específico da mãe.
- (C) A licença-maternidade pelo período de 100 dias é assegurada à gestante empregada, podendo ser solicitada a partir do final do nono mês de gestação.
- (D) A equipe da unidade neonatal e a equipe do banco de leite atuam conjuntamente, unindo forças para garantir orientações tardias sobre a técnica da extração manual, para que seja respeitado o restabelecimento do parto, e a mãe esteja em condições de iniciar a retirada de leite.
- (E) A mamadeira pode influenciar positivamente a amamentação. Observa-se que algumas crianças, depois de experimentarem a mamadeira, passam a apresentar maior habilidade quando vão mamar no peito.

**08.** Considere os seguintes procedimentos.

- I - Início do aleitamento materno logo após o parto.
- II - Amamentação em demanda programada.
- III- Técnica de amamentação adequada.
- IV- Abstenção do uso de suplementos (água, chás e outros tipos de leite).

Quais são medidas de prevenção do ingurgitamento mamário?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas I, III e IV.

**09.** Os sinais de infiltração ou extravasamento intravenoso apresentam características distintas, dependendo do tipo de medicamento ou solução que extravase. Geralmente, incluem um ou mais sinais mencionados a seguir, **EXCETO** um. Assinale-o.

- (A) Edema local ou que se estenda a toda a extremidade afetada.
- (B) Diminuição da perfusão local.
- (C) Cianose das extremidades.
- (D) Alteração da coloração da pele local, aspecto escuro e necrótico.
- (E) Formação de bolhas no local de infiltração.

**10.** Leia as seguintes afirmações sobre cuidados com cateter central de inserção periférica (PICC).

- I - É importante manter a fixação correta do cateter para prevenir a sua remoção acidental.
- II - O curativo deverá ser trocado se ele não estiver íntegro e bem aderido à pele ou seguindo a rotina estabelecida da instituição.
- III- Uma vez inserido o PICC, sua remoção só é indicada na alta hospitalar do neonato.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

**11.** Sobre as principais patologias do recém-nascido prematuro, analise as seguintes afirmações.

- I - São sinais de enterocolite necrotizante nos recém-nascidos as seguintes alterações: distensão abdominal, aumento de resíduo gástrico, resíduo gástrico bilioso, muco e/ou sangue nas fezes, piora clínica com letargia, apneia e acidose.
- II - Os principais sinais clínicos da persistência do canal arterial são: sopro cardíaco, impulsões precordiais, aumento da amplitude dos pulsos centrais e periféricos.
- III- Em geral, no período neonatal, a maioria das cardiopatias congênitas graves apresenta sopros cardíacos significativos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**12.** Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação à alimentação parenteral.

- (A) A alimentação parenteral é acompanhada de riscos, especialmente de complicações infecciosas.
- (B) A nutrição parenteral pode levar a distúrbios metabólicos imediatos, incluindo hiperglicemia, distúrbios eletrolíticos e hipertrigliceridemias.
- (C) Está sujeita a complicações associadas aos acessos venosos.
- (D) Está sujeita a complicações no longo prazo (doença colestática, doença óssea metabólica).
- (E) Adiar ao máximo a introdução da alimentação enteral é a principal estratégia para se evitar a colestase associada à alimentação parenteral.

**13.** Todos os medicamentos citados abaixo são necessários para o transporte seguro do neonato, **EXCETO**

- (A) adrenalina diluída.
- (B) dopamina, dobutamina e furosemida.
- (C) fenobarbital e difenil-hidantoína.
- (D) prostaglandina E1.
- (E) antibióticos, se estiverem em uso pelo paciente.

**14.** Sobre os equipamentos, os materiais e as medicações para o transporte seguro do recém-nascido, analise as seguintes afirmações.

- I - Os materiais eletrônicos necessários para o transporte – tais como incubadora de dupla parede, oxímetro de pulso, monitor cardíaco, ventilador eletrônico e bomba de infusão – devem ser portáteis, duráveis, leves, de fácil manutenção e devem estar sempre prontos e disponíveis.
- II - Os materiais não podem sofrer interferência eletromagnética e devem possuir um módulo de fixação adequado, suportar a descompressão aguda e as mudanças de temperatura e vibração, devem ser compatíveis com outros equipamentos de transporte e passar pelas portas de tamanho padrão dos hospitais.
- III- É importante ressaltar que toda medicação necessária para a reanimação deve estar preparada previamente ao início do deslocamento do paciente. Os medicamentos devem estar adequadamente identificados e bem acondicionados. Toda medicação utilizada deve ser repostada logo após o término do transporte.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**15.** Para se obter sucesso com o emprego de pressão positiva contínua de vias aéreas (CPAP) no recém-nascido, é fundamental o empenho, muitas vezes desgastante, da equipe multiprofissional na adequação e na manutenção do sistema e, principalmente, na vigilância contínua do recém-nascido. Nesse contexto, assinale a alternativa que **NÃO** apresenta cuidados fundamentais para garantir uma terapia eficaz.

- (A) Colocar um gorro na cabeça do recém-nascido, com o crânio alojado completamente no fundo da touca, para fixar adequadamente o circuito do CPAP.
- (B) Certificar-se de que a umidificação e o aquecimento dos gases estão adequados (36° C).
- (C) Manter umidificação e esvaziar periodicamente a água condensada no circuito.
- (D) Verificar periodicamente a adaptação da pronga às narinas, a permeabilidade das vias aéreas superiores, a posição do pescoço e o aspecto das asas e do septo nasal quanto à presença de isquemia e necrose.
- (E) Pode-se usar curativo de filme transparente e/ou hidrocoloide para proteção de partes moles da narina e do septo, eliminando a necessidade de inspeção contínua da pele em busca de lesões.

**16.** Quanto à adaptação do recém-nascido ao nascimento, assinale a afirmativa correta.

- (A) Na ausculta cardíaca do recém-nascido, sopros ou arritmias podem ser transitórios.
- (B) Ao nascer, a criança costuma ficar durante cerca de 1 a 2 horas muito desperta e, a seguir, habitualmente dorme profundamente por algumas horas, por vezes, até 12 horas.
- (C) É incomum a presença de cianose de extremidades, que se apresentam frias ao toque.
- (D) Um recém-nascido estável a termo apresenta hipertonia em flexão dos membros.
- (E) São comuns as variações de frequência e ritmo respiratório, observando-se pausas respiratórias curtas (cerca de 20 segundos) nos recém-nascidos prematuros.

**17.** Assinale a alternativa que apresenta a descrição de recém-nascidos considerados de alto risco.

- (A) Prematuro pesando menos de 2.000 g ao nascer, recém-nascido com asfixia grave ao nascer (Apgar < 7 no 5º minuto) e recém-nascido com outras patologias graves ao nascimento.
- (B) Prematuro independentemente do peso ao nascimento e recém-nascido com outras patologias graves ao nascimento.
- (C) Prematuro pesando menos de 2.000 g ao nascer, recém-nascido com asfixia grave ao nascer (Apgar < 9 no 5º minuto) e recém-nascido com outras patologias graves ao nascimento.
- (D) Prematuro pesando menos de 2.500 g ao nascer, recém-nascido com asfixia grave ao nascer (Apgar < 9 no 5º minuto) e recém-nascido com outras patologias graves ao nascimento.
- (E) Prematuro pesando menos de 2.500 g ao nascer, recém-nascido com asfixia grave ao nascer (Apgar < 7 no 5º minuto) e recém-nascido com outras patologias graves ao nascimento.

**18.** Os recém-nascidos apresentam características próprias de acordo com a idade gestacional (IG) ao nascimento. Sobre as características dos recém-nascidos, assinale a afirmativa correta.

- (A) Em relação ao tônus muscular, quanto mais próximo do termo, maior o tônus flexor.
- (B) A quantidade de vernix caseoso costuma ser maior em recém-nascidos a termo do que nos recém-nascidos pré-termo.
- (C) Equimoses são manchas comuns nos recém-nascidos pós-termo, e sua localização depende da apresentação e dos traumas sofridos, especialmente durante o parto.
- (D) A textura da pele do recém-nascido é um dos parâmetros utilizados na avaliação da IG, sendo que a do recém-nascido pré-termo se apresenta lisa, úmida e brilhante.
- (E) Deve-se evitar a realização do exame neurológico nas primeiras 12 horas de vida, para minimizar a influência do estresse do parto.

**19.** Assinale as afirmações abaixo sobre o exame físico do recém-nascido com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) A presença de uma linha delimitando um hemitórax com eritema e outro com coloração normal é conhecida como fenômeno de Arlequin.
- ( ) Lanugo é a denominação dada aos pelos finos que costumam recobrir a região do ombro e da escápula, encontrados de forma mais abundante nos recém-nascidos prematuros.
- ( ) *Milium* sebáceo é uma condição patogênica que se manifesta por pequenos pontos brancos, localizados na base do nariz, no queixo e na fronte.
- ( ) Manchas mongólicas são manchas azul-acinzentadas, localizadas preferencialmente no dorso e nas regiões glútea e lombossacra, não estando relacionadas a fatores raciais.
- ( ) Eritema tóxico geralmente aparece nos primeiros dias de vida, sob a forma de lesões eritematosas multiformes (pápulas, máculas e até algumas vesículas), esparsas ou confluentes.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F – V.
- (C) V – V – V – F – V.
- (D) F – V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

**20.** Todos os parâmetros a seguir quanto aos sinais vitais do recém-nascido estão corretos, **EXCETO** um. Assinale-o.

- (A) A frequência cardíaca varia, em média, de 120 a 140 bpm.
- (B) A frequência cardíaca em repouso acima de 170 bpm já é considerada taquicardia.
- (C) A frequência respiratória média é de 40 a 60 incursões por minuto.
- (D) A frequência respiratória média é de 20 a 40 incursões por minuto.
- (E) Temperatura axilar deve estar na faixa de 36,5 a 37º C.

**21.** Trata-se de um dos reflexos mais importantes a serem avaliados, pois pode indicar lesões nervosas, musculares ou ósseas. É desencadeado por algum estímulo brusco, como bater palmas, estirar bruscamente o lençol onde o recém-nascido está deitado ou soltar os braços semiesticados, ocorrendo a extensão-abdução dos membros superiores, conhecido também como reflexo de abraço.

Assinale a alternativa que apresenta o tipo de reflexo descrito no texto acima.

- (A) Reflexo de Moro.
- (B) Reflexo de fuga à asfixia.
- (C) Reflexo cutâneo-plantar.
- (D) Reflexo de Babinski.
- (E) Reflexo de sucção.

**22.** Assinale a alternativa correta em relação à icterícia neonatal.

- (A) A prematuridade não é fator de risco para hiperbilirrubinemia.
- (B) Icterícia presente nas primeiras 24 horas de vida é considerado fisiológico.
- (C) A dificuldade no aleitamento com consequente perda de peso não é fator de risco para desenvolvimento da icterícia.
- (D) O termo *kernicterus* é reservado à forma crônica da doença, não necessitando de tratamento, posto que não resulta em sequelas clínicas.
- (E) A hiperbilirrubinemia significativa presente na primeira semana de vida é um problema comum em recém-nascido a termo e pré-termo tardio.

**23.** Assinale a alternativa correta em relação à dor do recém-nascido.

- (A) O contato pele a pele entre mãe e filho tem se mostrado eficaz para diminuir a dor do recém-nascido.
- (B) A sucção não nutritiva tem eficácia quando adotada dez minutos antes da realização de alguns procedimentos, como a coleta de sangue capilar.
- (C) O emprego clínico de sacarose ou glicose por via oral não é considerado como benéfico no alívio da dor.
- (D) O aumento da estimulação tátil auxilia a reduzir o comportamento de estresse no recém-nascido.
- (E) Não há evidências, no período neonatal, de percepções sensoriais de dor.

**24.** Considere as seguintes afirmações sobre dor no recém-nascido.

- I - A Escala de Avaliação de Dor no Recém-Nascido e no Lactente (NIPS) é composta por cinco parâmetros comportamentais e um indicador fisiológico, que são avaliados antes, durante e após procedimentos invasivos agudos em recém-nascido a termo e pré-termo.
- II - A escala NIPS deve ser aplicada sempre que se registrem os sinais vitais, sendo considerada como quinto sinal vital.
- III - A avaliação da dor só deve ser realizada antes da administração das medidas farmacológicas de alívio da dor.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**25.** Ao nascerem, as crianças com defeito de fechamento do tubo neural, \_\_\_\_\_, devem ser colocadas em decúbito \_\_\_\_\_, manipuladas com extremo cuidado e em ambiente livre de látex. Deve-se sempre proteger a lesão de pressão externa, cobri-la com compressa \_\_\_\_\_ e colocar plástico poroso para evitar rotura, contaminação, perda de líquido e de calor.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) gastrosquise – lateral – estéril
- (B) gastrosquise – ventral – não estéril
- (C) meningomielocle e meningocele – lateral – estéril
- (D) gastrosquise – ventral – estéril
- (E) meningomielocle e meningocele – lateral – não estéril

**26.** Assinale a alternativa que apresenta a oftalmia neonatal prevenida pelo método de credeização logo após o nascimento.

- (A) Viral.
- (B) Sifilítica.
- (C) Hemorrágica ou hipertensiva.
- (D) Estafilocócica.
- (E) Gonocócica.

**27.** Assinale a alternativa correta quanto aos cuidados de enfermagem na profilaxia na transmissão vertical do HIV na admissão do recém-nascido.

- (A) Aspirar vigorosamente as vias aéreas.
- (B) Realizar o banho do recém-nascido antes da primeira hora do nascimento.
- (C) Estimular o aleitamento materno na primeira hora de vida.
- (D) Realizar o teste rápido para HIV no recém-nascido.
- (E) Realizar o banho tardiamente, preservando o vérnix como profilaxia.

**28.** Quanto aos cuidados de enfermagem relativos ao coto umbilical de um recém-nascido a termo saudável, a ação correta é higienizar, mantendo o coto

- (A) seco e ocluído.
- (B) limpo e umidificado.
- (C) limpo e seco.
- (D) umidificado e ocluído.
- (E) limpo e lubrificado.

**29.** Os cuidados com a pele do recém-nascido têm como finalidade a preservação da integridade cutânea, prevenção à toxicidade e exposição prejudicial à pele. Tendo em mente os cuidados de enfermagem ao recém-nascido e à sua pele, assinale a afirmativa correta.

- (A) O banho rotineiro do recém-nascido é uma profilaxia a infecções, sendo realizado logo após o nascimento com intuito de remoção parcial do vérnix.
- (B) O banho rotineiro do recém-nascido é uma profilaxia a infecções, sendo realizado logo após o nascimento com intuito de remoção total do vérnix.
- (C) O banho rotineiro do recém-nascido deve ser realizado com água morna e sabão alcalino.
- (D) O banho rotineiro do recém-nascido deve ser realizado com água morna e sabão neutro.
- (E) O banho rotineiro do recém-nascido deve ser realizado apenas com água morna.

**30.** No recém-nascido, a glicemia capilar é realizada, geralmente, através da punção do calcâneo, de onde se coleta sangue em pequena quantidade. Assinale a alternativa que apresenta cuidados que devem ser observados nesse procedimento.

- (A) Uso de agulha 40x12 mm ou lanceta adequada, para uma punção mais profunda e coleta hematológica em quantidade suficiente.
- (B) Coleta de sangue através da região maleolar, onde há maior vascularização.
- (C) Exposição do pé menos aquecido do recém-nascido, a fim de aumentar a vascularização antes do procedimento.
- (D) Manter a expressão da área perfurada após a punção com intuito de aumentar o fluxo sanguíneo, garantindo que o material coletado seja na quantidade suficiente.
- (E) A temperatura do membro a ser puncionado não interfere na coleta do material.

**31.** A infecção bacteriana de caráter sistêmico denominada sífilis é curável e exclusiva do ser humano. No caso de gestantes não tratadas ou tratadas inadequadamente, a sífilis poderá ser transmitida para o feto, mais frequentemente intraútero. Esse tipo de transmissão é denominada

- (A) vertical.
- (B) horizontal.
- (C) secundária.
- (D) mãe-filho.
- (E) primária.

**32.** Tendo em vista uma prescrição médica de um recém-nascido em que consta a administração de 3.000.000 UI de penicilina cristalina, o técnico de enfermagem deverá aspirar de um frasco com apresentação de 5.000.000 UI de penicilina cristalina, o qual foi diluído em 8 mL de água destilada, o volume de

- (A) 2,4 mL.
- (B) 1,2 mL.
- (C) 4,8 mL.
- (D) 5,8 mL.
- (E) 3,6 mL.

**33.** O método canguru é um modelo de atenção perinatal voltado para a atenção qualificada e humanizada do recém-nascido. Assinale a alternativa abaixo que **NÃO** representa uma vantagem do método.

- (A) Facilita o vínculo afetivo mãe/pai-filho.
- (B) Estimula o aleitamento materno.
- (C) Melhora a qualidade do desenvolvimento neuropsicomotor.
- (D) Reduz o estresse e a dor.
- (E) Contribui para a redução do uso de surfactante pulmonar.

**34.** A primeira etapa do método canguru tem início no \_\_\_\_\_. Nessa etapa, a equipe de saúde deve \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) parto – apoiar o acompanhante da mulher no nascimento – encaminhar o recém-nascido à UTI neonatal
- (B) pré-natal da gestação que necessita de cuidados especializados – promover o livre e precoce acesso dos pais à unidade neonatal – propiciar o contato pele a pele precoce
- (C) parto – propiciar o contato pele a pele precoce – oferecer suporte e apoio para a amamentação
- (D) pré-natal da gestação de baixo risco – explicar aos pais a necessidade de revezarem a visita ao recém-nascido – propiciar o contato pele a pele precoce
- (E) pré-natal da gestação que necessita de cuidados especializados – esperar o quanto for possível para estimular o contato pele a pele – diminuir os níveis de estímulos ambientais

**35.** Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto à elegibilidade do recém-nascido para a segunda etapa do método canguru.

- (A) O recém-nascido deve estar com um peso mínimo de 1.250 g.
- (B) A nutrição enteral deverá ser plena.
- (C) A utilização de medicações endovenosas intermitentes contraindica o encaminhamento do recém-nascido para a segunda etapa.
- (D) O recém-nascido precisa apresentar um quadro clinicamente estável.
- (E) O recém-nascido deve estar em aleitamento materno exclusivo.

**36.** Analise as ações seguintes.

- I - Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- II - Atendimento integral, com foco principal no tratamento, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- III- Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral.

Quais são diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**37.** Considere as seguintes afirmações sobre o controle térmico do recém-nascido.

- I - Quanto menor a idade gestacional e pior o estado clínico do recém-nascido pré-termo, maior será a necessidade de suporte térmico ambiental para mantê-lo normotérmico.
- II - A convecção é a principal forma de perda de calor em recém-nascidos prematuros, especialmente ao nascimento e nos primeiros dias de vida, sendo essa perda inversamente proporcional à idade gestacional.
- III- A temperatura do recém-nascido precisa ser avaliada com frequência e preferencialmente de forma contínua. A temperatura central pode ser obtida de forma intermitente por via axilar (preferencialmente com termômetro digital) ou contínua (por meio de sensor abdominal).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**38.** Assinale a alternativa correta quanto aos cuidados térmicos na unidade neonatal.

- (A) A temperatura de admissão dos recém-nascidos prematuros na unidade neonatal deve ser de pelo menos 36° C.
- (B) Somente recém-nascidos pré-termo devem ser mantidos em ambiente de termoneutralidade.
- (C) Pode-se abrir constantemente as portinholas da incubadora que sua temperatura permanece estável, devido ao sistema inteligente de convecção do ar.
- (D) A perda de calor pela cabeça do recém-nascido não pode ser evitada com a utilização de gorros.
- (E) Recém-nascidos prematuros com menos de 1.500 g de peso ao nascer não necessitam ser envoltos em saco de polietileno.

**39.** O ambiente sonoro na unidade neonatal interfere na organização do recém-nascido. Assinale a alternativa que contém efeitos fisiológicos dos ruídos nos neonatos.

- (A) Aumento da saturação de oxigênio e aumento da pressão arterial.
- (B) Hipoglicemia e alteração na frequência cardíaca.
- (C) Aumento na pressão intracraniana e hipoglicemia.
- (D) Alteração na frequência cardíaca e diminuição na saturação de oxigênio.
- (E) Apneias e hipoglicemia.

**40.** Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto à apneia da prematuridade.

- (A) Para prevenção de apneia obstrutiva, deve-se evitar a hiperextensão ou hiperflexão do pescoço do recém-nascido.
- (B) Recém-nascidos prematuros nascidos de parturientes nas quais foi utilizado sulfato de magnésio podem apresentar apneia.
- (C) A oxigenoterapia com um alto fluxo de oxigênio reduz os episódios de apneias.
- (D) O citrato de cafeína utilizado no tratamento da apneia pode provocar alterações cardíacas e poliúria.
- (E) O uso da pressão positiva contínua de vias aéreas (CPAP) pode reduzir em até 50% os episódios de apneia, caso sejam proporcionadas adequadas pressões.