



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 07/2021
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 67 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
(Centro Obstétrico e Internação Obstétrica)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Parece que o vento maneja o tempo.



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. A prática de colocar as crianças para dormir em _____ no alojamento conjunto e o fornecimento de informações simples e claras quanto ao posicionamento recomendado do bebê para dormir devem fazer parte da rotina dos profissionais de saúde que atuam em alojamento conjunto, como forma de prevenir a morte súbita do recém-nascido.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase acima.

- (A) decúbito lateral direito
- (B) decúbito lateral esquerdo
- (C) decúbito dorsal
- (D) decúbito ventral
- (E) posição prona

02. Assinale a alternativa **INCORRETA** que apresenta os pontos-chave que caracterizam o posicionamento e a pega adequados na amamentação de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

- (A) Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo.
- (B) Corpo do bebê próximo ao da mãe.
- (C) Mais aréola visível acima da boca do bebê que embaixo.
- (D) Bochechas do bebê encovadas a cada sucção.
- (E) Lábio inferior virado para fora.

03. Quais medidas **NÃO** devem ser adotadas no manejo do ingurgitamento mamário patológico?

- (A) Ordenha manual da aréola, se estiver tensa, antes da mamada, para que fique macia, facilitando a pega adequada do bebê. A ordenha deve ser delicada.
- (B) Compressas quentes (ou bolsa de água aquecida envolta em tecido) nas mamas antes das mamadas. Em situações de maior gravidade, podem ser feitas de duas em duas horas.
- (C) Suporte para as mamas, com o uso ininterrupto de sutiã com alças largas e firmes, para alívio da dor e manutenção dos ductos em posição anatômica.
- (D) Mamadas frequentes, sem horários preestabelecidos (livre demanda).
- (E) Massagens delicadas das mamas, com movimentos circulares, particularmente nas regiões mais afetadas pelo ingurgitamento. Elas fluidificam o leite viscoso acumulado, facilitando sua retirada, e são importantes estímulos do reflexo de ejeção do leite.

04. Os sinais característicos de desconforto respiratório nos recém-nascidos (RNs) são os abaixo listados, **EXCETO** um deles. Assinale-o.

- (A) FR < 60mrpm.
- (B) Apneia ou pausa respiratória.
- (C) Retrações subcostais, intercostais ou esternais, sendo, esta última, a mais encontrada no RN prematuro.
- (D) Batimentos de asas nasais.
- (E) Gemência.

05. Os principais sinais clínicos de sepse neonatal são os abaixo listados, **EXCETO** um deles. Assinale-o.

- (A) Hipoglicemia.
- (B) Instabilidade térmica.
- (C) Dificuldade respiratória.
- (D) Hipotonia e convulsões.
- (E) Irritabilidade e letargia.

06. O RN, quando sintomático de sífilis congênita ao nascer, pode apresentar

- (A) hipospádia.
- (B) apêndice auricular.
- (C) dedos extranumerários.
- (D) eritema tóxico.
- (E) lesões cutaneomucosas.

07. Em relação à sífilis congênita, foi prescrito para o RN: penicilina benzatina 1.200.000 UI – administrar 150.000 UI, IM, 1x ao dia, dose única. Observação: a farmácia dispensa a medicação já em suspensão de 4mL.

Conforme a prescrição acima, qual dose deve ser administrada ao RN e em qual região esta deve ser aplicada?

- (A) 0,6mL em deltoide.
- (B) 0,5mL em face lateral da coxa.
- (C) 0,4mL em deltoide.
- (D) 0,3mL em face lateral da coxa.
- (E) 0,2mL em deltoide.

08. Em relação à hipoglicemia no RN, qual manifestação clínica, dentre as abaixo listadas, os RNs sintomáticos podem apresentar?

- (A) Sudorese.
- (B) Agitação.
- (C) Tremores.
- (D) Hipertermia.
- (E) Bradipneia.

09. Em relação às medidas de orientação frente à COVID-19, considerando puérperas com COVID-19 e clinicamente estáveis com RNs assintomáticos, assinale a afirmação correta.

- (A) Desaconselha-se amamentação exclusiva.
- (B) O leite deverá ser ordenhado pela equipe assistencial e após desprezado.
- (C) Devem ser usadas máscaras cobrindo o nariz e a boca, somente durante a amamentação.
- (D) Não podem permanecer com acompanhante, mesmo que saudável.
- (E) Devem ficar em isolamento privativo e manter a distância de, no mínimo, um metro entre leito e berço.

10. Em relação à assistência à gestante e à puérpera frente à pandemia de COVID-19, assinale a alternativa correta.

- (A) Mulheres assintomáticas apresentam menor risco de morbidade materna e pré-eclâmpsia.
- (B) A transmissão vertical é pouco frequente. Poderá ser realizado clampamento tardio do cordão umbilical ou contato pele a pele, amamentação ou alojamento conjunto, desde que as medidas de precaução sejam mantidas.
- (C) Os principais fatores de risco na gestação são idade maior que 30 anos, colestase e doenças preexistentes, particularmente a hipertensão e o diabetes.
- (D) O local de atendimento destinado a gestantes com suspeita ou confirmação para COVID-19 deve ser identificado, não necessitando ser separado do atendimento de rotina.
- (E) A COVID-19 é indicação para parto cesáreo.

11. Sobre o acolhimento e classificação de risco em obstetrícia, considere os itens abaixo.

- I - Preencher as fichas das mulheres vítimas de violência e proceder ao tratamento segundo protocolo específico.
- II - Aferir sinais vitais da mulher.
- III- Encaminhar/orientar usuária quanto ao local de realização de exames e de medicação, quando for o caso.

Quais são atribuições do técnico/auxiliar de enfermagem?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

12. Considere o trecho a seguir referente à terapia com sulfato de magnésio.

A administração da dose de manutenção deverá ser suspensa caso a frequência respiratória tenha menos de _____ incursões por minuto, os reflexos patetares estejam _____ ou a diurese seja inferior a _____ durante as 4 horas precedentes.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) 16 – completamente abolidos – 100mL
- (B) 16 – completamente presentes – 100mL
- (C) 12 – completamente abolidos – 120mL
- (D) 12 – completamente presentes – 120mL
- (E) 16 – intermitentes – 120mL

13. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as síndromes hemorrágicas às suas respectivas definições.

- (1) Gravidez ectópica
- (2) Descolamento prematuro de placenta
- (3) Placenta prévia
- (4) Abortamento
- () Interrupção da gravidez ocorrida antes da 22ª semana de gestação.
- () Nidação do ovo fora da cavidade uterina.
- () Separação da placenta da parede uterina antes do parto.
- () Implantação total ou parcial da placenta no segmento inferior do útero.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 1 – 4.
- (B) 4 – 2 – 1 – 3.
- (C) 1 – 3 – 4 – 2.
- (D) 4 – 1 – 2 – 3.
- (E) 2 – 3 – 1 – 4.

14. A terapia anticonvulsivante é indicada para a prevenção de convulsões recorrentes em mulheres com eclâmpsia, assim como o aparecimento de convulsões naquelas com pré-eclâmpsia. Qual a medicação usada nessas situações?

- (A) Hidralazina.
- (B) Sulfato de magnésio.
- (C) Gluconato de cálcio.
- (D) Nifedipina.
- (E) Metildopa.

15. O diabetes gestacional é definido como a "intolerância aos carboidratos, de graus variados de intensidade, diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto". Sobre esse tema, marque **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) para os procedimentos adequados com gestantes em trabalho de parto espontâneo que fazem uso de insulina.

- () Realizar uma dosagem de glicemia na admissão.
- () Manter o uso de insulina.
- () Monitorar a glicemia.
- () Os níveis de glicemia capilar devem ser mantidos entre 70 e 110mg/dL.
- () Manter a gestante em NPO (nada por via oral).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) F – F – V – V – V.
- (C) V – F – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) F – V – V – F – V.

16. Considere as seguintes afirmações sobre práticas integradas na atenção ao parto.

- I - O contato pele a pele entre a mãe e seu recém-nascido após o parto (colocar o bebê sem roupa, de bruços, sobre o tórax ou abdômen desnudo da mãe, e cobri-los com um cobertor aquecido) ajuda na adaptação do recém-nascido à vida extrauterina.
- II - Imediatamente após o parto, devem-se priorizar procedimentos rotineiros de atenção ao recém-nascido, tais como verificar medidas antropométricas, aplicar vacinas, vitamina K e colírio de nitrato de prata, e, após, deixá-lo com contato pele a pele com a mãe.
- III- O contato pele a pele não deve estar limitado à sala de parto; deve ser praticado tão frequentemente quanto possível durante os primeiros dias de vida, para manter a temperatura do recém-nascido, promover a amamentação e fortalecer o vínculo entre a mãe e o seu bebê.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

17. Sobre os cuidados de mulheres em trabalho de parto, é correto afirmar que

- (A) mulheres em trabalho de parto devem permanecer em jejum, constando na prescrição médica "NPO".
- (B) a analgesia com cateter peridural deve ser a primeira escolha no manejo da dor do trabalho de parto.
- (C) a manobra de Kristeller é uma técnica recomendada para abreviar o período expulsivo.
- (D) as mulheres devem ter acompanhantes de sua escolha durante o trabalho de parto e o parto, incluindo o apoio dado por pessoal de fora da rede social da mulher.
- (E) o modelo de assistência que inclui a enfermeira obstétrica e obstetrix na assistência ao parto de baixo risco apresenta vantagens em relação ao aumento de intervenções e menor satisfação das mulheres.

18. Considere as afirmações abaixo sobre o manejo da dor no trabalho de parto.

- I - Os profissionais de saúde devem refletir como suas próprias crenças e valores influenciam a sua atitude em lidar com a dor do parto e garantir que os seus cuidados apoiem a escolha da mulher.
- II - Sempre que possível, deve ser oferecido à mulher a imersão em água para alívio da dor no trabalho de parto.
- III- Apoiar que sejam tocadas as músicas de escolha da mulher durante o trabalho de parto.
- IV - A solicitação materna por analgesia de parto compreende indicação suficiente para sua realização, independentemente da fase do parto e do grau de dilatação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

19. Considere o trecho abaixo sobre os cuidados gerais no trabalho de parto.

Mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com _____, ter acesso às informações baseadas em _____ e ser incluídas na tomada de decisões. Para isso, os profissionais que as atendem deverão estabelecer uma relação _____ com elas, perguntando-lhes sobre seus desejos e expectativas.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) distância – experiências – soberana
- (B) respeito – evidências – de confiança
- (C) reserva – vivências – hegemônica
- (D) respeito – experiências – hegemônica
- (E) distância – evidências – de confiança

20. Sobre os cuidados de mulheres em trabalho de parto, é correto afirmar que

- (A) a assistência ao parto e nascimento de baixo risco que se mantenha dentro dos limites da normalidade pode ser realizada tanto por médico obstetra quanto por enfermeira obstétrica e obstetriz.
- (B) o enema e a tricotomia devem ser realizados de forma rotineira durante o trabalho de parto.
- (C) as mulheres devem permanecer em decúbito lateral esquerdo e monitoradas durante o trabalho de parto.
- (D) deve-se encorajar a realização de puxos dirigidos no período expulsivo em todas as mulheres.
- (E) a administração de 40 UI de ocitocina intramuscular após o nascimento está associada com menor risco de hemorragia e transfusão sanguínea.

21. Quais são os principais fatores associados à transmissão vertical do HIV?

- (A) Carga viral elevada e rotura prolongada das membranas amnióticas.
- (B) Cesariana prévia e sífilis.
- (C) Carga viral elevada e clameamento precoce do cordão umbilical.
- (D) Parto vaginal e sífilis.
- (E) Cesariana prévia e clameamento precoce do cordão umbilical.

22. Considere o trecho a seguir sobre o manejo intraparto em pacientes HIV positivas.

Havendo condições favoráveis para o parto vaginal e estando este indicado, iniciar _____ por via intravenosa logo que a parturiente chegar ao serviço, conforme o protocolo estabelecido, e manter a infusão até _____.

- (A) nevirapina – a ligadura do cordão umbilical
- (B) AZT – 24 horas após o parto
- (C) AZT – a ligadura do cordão umbilical
- (D) nevirapina – 24 horas após o parto
- (E) nifedipina – a ligadura do cordão umbilical

23. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os cuidados de rotina ao recém-nascido às suas respectivas descrições.

- (1) Laqueadura do cordão umbilical.
- (2) Prevenção da oftalmia gonocócica pelo método de Credé.
- (3) Antropometria.
- (4) Prevenção do sangramento por deficiência de vitamina K.
- (5) Detecção de incompatibilidade sanguínea materno-fetal.
- () Instilar uma gota de nitrato de prata a 1% no fundo do saco lacrimal inferior de cada olho.
- () Fixar o *clamp* à distância de 2 a 3 cm do anel umbilical.
- () Administrar 1mg por via intramuscular ou subcutânea ao nascimento.
- () Coletar sangue da mãe e do cordão umbilical para determinar os antígenos dos sistemas ABO e Rh.
- () Exame físico simplificado, incluindo peso, comprimento e perímetros cefálico, torácico e abdominal.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (B) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.
- (C) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.
- (D) 2 – 4 – 1 – 5 – 3.
- (E) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.

24. Sobre o manejo de hemorragia pós-parto, quais medicações, dentre as abaixo listadas, podem ser utilizadas?

- (A) Ocitocina, nifedipino, metrotexato, ácido tranexâmico.
- (B) Sulfato de magnésio, metilergometrina, ampicilina, nifedipino.
- (C) Cefalexina, misoprostol, ocitocina, ácido tranexâmico.
- (D) Ocitocina, metilergometrina, misoprostol, ácido tranexâmico.
- (E) Sulfato de magnésio, ampicilina, nifedipino, misoprostol.

25. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento adequado para com gestantes em trabalho de parto prematuro.

- (A) Estimular deambulação.
- (B) Restringir a presença de acompanhante.
- (C) Realizar enema.
- (D) Manter NPO.
- (E) Comunicar se a temperatura axilar for $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 07/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 67

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Centro Obstétrico e Internação Obstétrica)

01.	C	11.	D	21.	A
02.	D	12.	A	22.	C
03.	B	13.	D	23.	B
04.	A	14.	B	24.	D
05.	A	15.	A	25.	E
06.	E	16.	D		
07.	B	17.	ANULADA		
08.	C	18.	E		
09.	E	19.	B		
10.	B	20.	A		