

Formulário de Resposta de Recurso

ALTERAÇÃO DO GABARITO

RECURSOS QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA



Protocolo: 0000000371

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - EDITAL Nº 04/2025 - GERAL

RECURSO QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA

RESPOSTA A RECURSO

PS 41 - MÉDICO I (MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE)

Nº DA QUESTÃO: 7

Na questão 7, solicita-se que analise as afirmativas com base no quadro clínico descrito.

A

afirmativa I coloca que a presença de doença renal crônica em paciente diabético pela presença de albuminúria maior que 30 mg/g e TFGe menor que 60 mL/min/1,73m², contudo pela bibliografia do concurso DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E. M. J. Medicina ambulatorial: Condutas de atenção primária baseadas em evidências. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022, no capítulo 36 sobre manejo longitudinal da pessoa com diabetes, na sessão de rastreamento e diagnóstico há a seguinte frase: " considera-se como doença renal crônica a presença de TFG menor que 60 mL/min/1,73m² ou evidencia de lesão na estrutura renal (p. ex., albuminúria) por 3 meses ou mais.". Tornando essa afirmativa errada.

A afirmativa II coloca que a metformina deve ser imediatamente suspensa se TFGe estiver abaixo de 60 mL/min/1,73m². A afirmativa está errada, que visto a bibliografia do concurso DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E. M. J. Medicina ambulatorial: Condutas de atenção primária baseadas em evidências. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022, no capítulo 43 de Doença Renal Crônica, evidencia que é possível o uso de metformina com TFGe entre 60 e 30 mL/min/1,73m², devendo ser suspensa somente se menor que 30 mL/min/1,73m².

A afirmativa III coloca que a glibenclamida,

apesar de constar na REMUME e na Farmácia Popular, deve ser evitada em pacientes com doença renal crônica. Segundo a bibliografia do concurso GUSSO, G.; LOPES, J. M. C.; e DIAS, L. C. (org). Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação e prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019, na página 1535 há um parágrafo que coloca que a glibenclamida apresenta maior risco de hipoglicemia e as sulfonilureias e seus metabolitos não devem ser utilizados em pacientes com perda significativa de função renal, com excessão da gliclazida, que pode ser usada com muita cautela. Não há bibliografia no concurso que inclua as medicações da REMUME (que pode variar em cada município) e as medicações da farmácia popular, contudo essa medicação consta nas duas listas de medicações distribuídas pelo SUS na maior parte do território brasileiro. Torando essa afirmativa correta.

A

afirmativa IV coloca que o paciente teria indicação de segunda droga anti-diabética, já que hemoglobina glicada permanece acima da meta apesar de uso de metformina em dose plena. Segundo a bibliografia do concurso DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E. M. J. Medicina ambulatorial: Condutas de atenção primária baseadas em evidências. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022

no capítulo 36, afirma que um alvo inferior a 7,5% é considerado razoável em idosos. Nesse sentido a afirmativa esta correta.

Sendo assim, as afirmativas corretas são a III e a IV, letra C do gabarito e não a letra A (apenas I e IV). Por isso solicito a troca do gabarito para a alternativa D.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

ALTERNATIVA DEFERIDA: C

JUSTIFICATIVA: pela bibliografia do concurso DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E. M. J. Medicina ambulatorial: Condutas de atenção primária baseadas em evidências. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022, no capítulo 36 sobre manejo longitudinal da pessoa com diabetes, na sessão de rastreamento e diagnóstico há a seguinte frase: " considera-se como doença renal crônica a presença de TFG menor que 60 mL/min/1,73m² ou evidencia de lesão na estrutura renal (p. ex., albuminúria) por 3 meses ou mais.". Pela afirmação, dá-se a entender que são dois critérios obrigatórios imprescindíveis. O que é equivocado.

Resposta trocada para Apenas III e IV. (letra C)