

Formulário de Resposta de Recurso

ANULAÇÃO DE QUESTÃO

RECURSOS QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA



Protocolo: 0000000218

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - EDITAL Nº 04/2025 - GERAL

RECURSO QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA

RESPOSTA A RECURSO

PS 38 - MÉDICO I (CIRURGIA GERAL)

Nº DA QUESTÃO: 20

Apresento recurso contra o gabarito preliminar da questão 20, solicitando a anulação da questão.

A

alternativa considerada correta pela banca examinadora (letra D) vai de encontro ao que é preconizado no livro "Sabiston Textbook of Surgery - 21ª edição". Este livro, referência na área cirúrgica e uma das literaturas indicadas no edital deste concurso, estabelece claramente a sequência de tratamento em casos de falha da endoscopia: "If the endoscopy is unable to achieve hemostasis, angiography should be performed. Surgery is the next step if angiography fails or is not available." (Cap. 47 Acute Gastrointestinal Hemorrhage, subcapítulo Peptic Ulcer Disease Management, pág. 1153). Tradução: "Se a endoscopia for incapaz de alcançar a hemostasia, a angiografia deve ser realizada. A cirurgia é o próximo passo se a angiografia falhar ou não estiver disponível."

Portanto, a

alternativa mostra-se errada ao afirmar que "a abordagem cirúrgica de úlcera péptica com sangramento ativo é indicada como primeira opção em casos de sangramento refratário às terapias endoscópicas". Embora a cirurgia seja uma opção em casos selecionados, ela não é a primeira escolha após a falha da endoscopia, conforme a referência indicada pelo edital do concurso.

Adicionalmente, o Sabiston enfatiza

a importância da angiografia e embolização no diagnóstico e tratamento da hemorragia digestiva alta nas passagens a seguir (Cap. 47 Acute Gastrointestinal Hemorrhage, subseção Angiographic management, pág. 1155:

- "Angiography is diagnostic as well as therapeutic and should be considered if a patient has failed endoscopic management or if the bleeding has not been localized". Tradução: "A angiografia é diagnóstica, assim como terapêutica, e deve ser considerada se um paciente falhou no tratamento endoscópico ou se o sangramento não foi localizado."

- "Transcatheter arterial embolization

is effective at hemorrhage control when a bleeding source is found. Superselective embolization allows control of bleeding while maintaining adequate collateral flow to prevent bowel infarct".

Tradução: "A embolização arterial transcatheter é eficaz no controle da hemorragia quando uma fonte de sangramento é encontrada. A embolização superseletiva permite o controle do sangramento, mantendo

o fluxo colateral adequado para prevenir o infarto intestinal."

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: O recurso tem base para anulação da questão.