

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 03/2022

DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Superior

PS 15 - MÉDICO I
(Hebiatra)

	MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO	
	Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada	

ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Os olhos são a janela da alma.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.



FAURGS

Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 03/2022 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 15

MÉDICO I (Hebiatra)

01.	A	11.	A	21.	E
02.	E	12.	D	22.	E
03.	B	13.	C	23.	C
04.	E	14.	E	24.	B
05.	A	15.	E	25.	D
06.	B	16.	B		
07.	D	17.	A		
08.	C	18.	A		
09.	B	19.	A		
10.	C	20.	D		

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame**, portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, telefones celulares, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei, como o uso recomendado de máscaras, em virtude da pandemia do Coronavírus. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Num ambulatório para adolescentes, você atende uma menina de 13 anos e seis meses de idade, cujos pais a trouxeram à consulta para confirmar ou afastar um diagnóstico de gravidez, depois de terem descoberto que ela tivera relações sexuais com o namorado de 16 anos. De acordo com as normas legais brasileiras, a notificação do caso

- (A) é obrigatória, pois está caracterizado crime de estupro de vulnerável.
- (B) não se aplica, já que as relações sexuais eram consensuais, entre namorados.
- (C) não se aplica, uma vez que envolve dois menores de idade.
- (D) é obrigatória se for comprovada a gravidez.
- (E) só cabe se houver suspeita de violência ou grave ameaça.

02. As "Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde", publicadas pelo Ministério da Saúde em 2010, seguem a convenção da Organização Mundial da Saúde que delimita como adolescência o período entre 10 e 20 anos incompletos e como juventude aquele entre 15 e 24 anos. Esse documento

- (A) propõe uma visão holística do ser humano, mas evita uma abordagem sistêmica dessa população, enfatizando estratégias baseadas na resolução de problemas específicos.
- (B) enfatiza ações equânimes de âmbito nacional e limita a importância da construção de estratégias interfederativas e intersetoriais.
- (C) se aplica sem exceções a toda a população jovem, sem menção a modificações do quadro nacional de vulnerabilidade nessa faixa e idade.
- (D) garante os direitos dos adolescentes e jovens, condicionando-os a fatores de gênero, etnia e origens.
- (E) é um marco legal para o empreendimento de ações eficazes que proporcionarão aos adolescentes e jovens a formação da consciência cidadã.

03. Assinale a assertiva correta quanto ao desenvolvimento pubertário normal.

- (A) O primeiro sinal de puberdade nas meninas é a telarca, que pode ocorrer a partir dos oito anos, mas jamais depois dos onze.
- (B) Nos meninos, o primeiro sinal de puberdade é o aumento do volume testicular, que fica maior do que 4 mL e ocorre entre 9 e 14 anos de idade.
- (C) O estirão do crescimento ocorre nas meninas entre os estágios II e III de Tanner, correspondendo à idade óssea de 13 anos; nos meninos, ocorre no estágio III de Tanner, correspondendo à idade óssea de 15 anos.
- (D) Nos meninos, a mudança da voz, o surgimento da barba e a primeira ejaculação precedem o estirão de crescimento em cerca de dois anos.
- (E) A presença de odor axilar, acompanhada do surgimento de pelos pubianos e axilares, sem outros sinais, sinaliza a adrenarca, causada pela produção de androgênios pelas glândulas adrenais, por sua vez desencadeada pela ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas.

04. Assinale a assertiva correta quanto ao atraso constitucional do desenvolvimento pubertário.

- (A) Trata-se da causa mais frequente de atraso puberal, chegando a responder por até 90% dos casos em meninos e 60% em meninas.
- (B) Não costuma ter histórico familiar significativo.
- (C) Pode ser anunciado pela redução marcada na velocidade de crescimento ao longo da idade escolar.
- (D) Na adolescência, o atraso na curva de estatura para idade se acentua, mostrando-se incompatível com a idade óssea.
- (E) O aumento da velocidade de crescimento, acompanhando os eventos puberais, ocorre em idades superiores à média, mas em geral antes dos 18 anos; e a estatura final costuma ficar dentro do canal familiar.

05. É do interesse precípua do médico de adolescentes o fato de que os traumatismos relacionados aos meios de transporte causam mais do que 10% de todas as mortes de brasileiros nessa faixa de idade. O que é correto afirmar em relação a esse tema, considerando a população brasileira?

- (A) O Brasil se destaca quanto às leis de segurança no trânsito, sobretudo pela restrição ao ato de beber e dirigir, o controle de velocidade e normas quanto ao uso de cinto de segurança e de capacete por motociclistas.
- (B) No final da adolescência, a incidência de mortes no trânsito ultrapassa a dos homicídios.
- (C) Ao longo da adolescência, a taxa percentual de mortes de motociclistas aumenta gradativamente, ao contrário da dos ciclistas, que se reduz acentuadamente.
- (D) A relação de incidência entre atropelamentos e traumatismos de ocupantes de veículos automotores se mantém estável ao longo de toda a adolescência.
- (E) A mortalidade de brasileiros no trânsito apresenta uma relação inversa com o produto interno bruto do país.

06. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando os níveis de atenção às estratégias de enfrentamento à violência interpessoal e à autoagressão na adolescência.

- | | |
|----------------|---|
| (1) Primordial | () Centros de reinserção social |
| (2) Primária | |
| (3) Secundária | () Campanhas contra uso de armas |
| (4) Terciária | |
| | () Prevenção de infecções transmitidas por sexo em vítimas de violência sexual |
| | () Empoderamento de gênero |

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 2 – 3.
- (B) 4 – 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2 – 4.
- (D) 3 – 2 – 4 – 1.
- (E) 4 – 3 – 1 – 2.

07. Na fisiopatogenia da acne concorrem vários processos, entre eles, a colonização da unidade pilosebácea por bactérias e fungos, os quais estão descritos nas alternativas abaixo, **EXCETO**:

- (A) *Propionibacterium acnes*.
- (B) *Propionibacterium avidum*.
- (C) *Staphylococcus epidermidis*.
- (D) *Streptococcus pyogenes*.
- (E) *Malassezia furfur*.

08. Para distinguir a artrite séptica da sinovite transitória pode ser utilizado um escore clínico preditivo baseado em quatro fatores independentes (Kocher *et al.*, 1999). Esses quatro fatores são: 1) febre > ____°C; 2) dor com limitação de movimentos passivos, limitações de apoio e deambulação; 3) velocidade de hemossedimentação (VHS) > ____ mm/1ª hora; e 4) leucócitos > ____ /mm³.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) 38,5 – 80 – 20.000
- (B) 39,5 – 40 – 12.000
- (C) 38,5 – 40 – 12.000
- (D) 39,5 – 80 – 15.000
- (E) 39,0 – 40 – 15.000

09. Qual das alternativas abaixo **NÃO** é considerada um dos critérios maiores de Jones para a febre reumática, modificados e revisados em 2015?

- (A) Cardite (clínica ou subclínica).
- (B) Poliartralgia para populações de baixo risco e monoartralgia ou poliartralgia para populações de alto risco.
- (C) Coreia.
- (D) *Eritema marginatum*.
- (E) Nódulos subcutâneos.

10. São efeitos adversos causados pelo uso de esteroides anabolizantes androgênicos no sistema cardiovascular, **EXCETO**:

- (A) dislipidemia.
- (B) hipertensão.
- (C) hipertrofia ventricular direita.
- (D) arritmia.
- (E) infarto agudo do miocárdio.

11. Menina de 14 anos compareceu à consulta no pronto-atendimento com história de febre não mensurada e disúria há cerca de três dias. Menarca há dois anos e, atualmente, com ciclos menstruais regulares. Nega sexarca. O exame físico não mostrou alterações. No exame qualitativo de urina foi identificada piúria e sua urocultura apresentou uma contagem de 80.000 colônias/mL. Qual é a melhor conduta a ser indicada?

- (A) Nitrofurantoína 100 mg a cada 6 horas por 3 dias.
- (B) Norfloxacin 400 mg a cada 12 horas por 3 dias.
- (C) Ciprofloxacino 250 mg a cada 12 horas por 5 dias.
- (D) Banhos de assento com cloridrato de benzidamina por uma semana.
- (E) Orientações gerais e retorno se piora clínica.

12. Leia com atenção o parágrafo abaixo sobre anticoncepção de emergência na adolescência.

A anticoncepção de emergência deve ser utilizada até _____ após relação sexual sem proteção, podendo ser considerada até o _____ após relação sexual desprotegida. A forma de administração mais indicada é o uso de _____ de levonorgestrel ou o uso deste associado com _____ (método Yuzpe).

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) 48h – 3º dia – 1,5 mg – progesterona
- (B) 72h – 3º dia – 2 mg – etinilestradiol
- (C) 48h – 5º dia – 1,5 mg – etinilestradiol
- (D) 72h – 5º dia – 1,5 mg – etinilestradiol
- (E) 48h – 5º dia – 2 mg – progesterona

13. Considere as afirmações abaixo sobre a relação entre medicações e alterações lipídicas na adolescência.

- I - Progestágenos e tiazídicos podem causar aumento dos níveis de LDL.
- II - Esteroides anabolizantes podem diminuir níveis de HDL.
- III- Betabloqueadores podem diminuir níveis de triglicérides.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

14. Considere os itens abaixo sobre dismenorreia na adolescência.

- I - Endometriose
- II - Cistos ovarianos
- III- Doença inflamatória pélvica

Quais são diagnósticos diferenciais?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

15. Assinale as assertivas abaixo sobre características da ginecomastia fisiológica do adolescente com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Uso de álcool e maconha estão associados à ocorrência de ginecomastia.
- () Acompanha a fase do estirão puberal.
- () É comum ocorrer após os 17 anos de idade.
- () A maioria dos casos é transitória e regride espontaneamente após 1 a 3 anos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – F.
- (C) V – F – V – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – V – F – V.

16. Em relação à vacinação em adolescentes, assinale a afirmativa correta.

- (A) Na ausência de dose prévia de tríplice viral, indicar apenas 1 dose da vacina.
- (B) Se imunossuprimido aos 13 anos de idade, indicar 3 doses de vacina HPV.
- (C) Para não vacinado contra meningococo B, indicar a vacina em dose única.
- (D) Para não vacinado contra meningococo ACWY aos 17 anos, indicar 2 doses da vacina.
- (E) Se já vacinado com 3 doses contra hepatite B na infância, indicar 1 dose de reforço da vacina.

17. Em casos de incongruência de gênero, nos quais está indicada a supressão hormonal (bloqueio hormonal), assinale a afirmação correta.

- (A) Apenas deve ser iniciada a partir do estágio 2 de Tanner.
- (B) Se iniciada no estágio 5 de Tanner, ainda é possível evitar o desenvolvimento das características sexuais.
- (C) Tem como objetivo suprimir de forma definitiva as alterações físicas puberais.
- (D) Em casos com possível indicação cirúrgica, a supressão hormonal deve iniciar-se no estágio 1 de Tanner.
- (E) Se iniciada nos estágios 3-4 de Tanner, não será possível regredir algumas características sexuais (menstruações e ereções).

18. Considere os seguintes conceitos e suas definições relacionados à incongruência de gênero na adolescência.

- I - Cisgênero refere-se à pessoa cuja identidade de gênero se identifica com o sexo biológico.
- II - Identidade de gênero é a experiência emocional, psíquica e social em relação ao gênero.
- III- Orientação sexual corresponde à forma como a pessoa exterioriza seu gênero e não necessariamente se correlaciona com o sexo ou a identidade de gênero.
- IV- Expressão sexual é a capacidade de ter atração emocional, afetiva e/ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

19. Qual o tratamento farmacológico indicado para vaginite e uretrite causada por *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*?

- (A) Ceftriaxona 250 mg intramuscular em dose única e Azitromicina 1 g via oral em dose única.
- (B) Metronidazol 2 g via oral em dose única e Azitromicina 2 g via oral em dose única.
- (C) Fluconazol 150 mg via oral em dose única e Azitromicina 1 g via oral em dose única.
- (D) Doxiciclina 100 mg via oral de 12/12h por 7 dias.
- (E) Ciprofloxacino 500 mg via oral em dose única.

20. Leia com atenção o parágrafo abaixo sobre problemas no desenvolvimento puberal.

No sexo feminino, puberdade precoce é considerada quando ocorre qualquer sinal de maturação sexual antes dos _____ de idade e puberdade tardia é considerada quando a telarca e pubarca ocorrem em idades superiores a _____ e _____, respectivamente, e a menarca acima dos _____ de idade.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) 9 anos – 13 anos – 14 anos – 16 anos
- (B) 8 anos – 12 anos – 15 anos – 16 anos
- (C) 9 anos – 12 anos – 15 anos – 14 anos
- (D) 8 anos – 13 anos – 14 anos – 16 anos
- (E) 9 anos – 12 anos – 14 anos – 14 anos

21. Em relação à doença de Osgood-Schlatter, assinale a alternativa correta.

- (A) Ocorre mais frequentemente em adolescentes do sexo feminino.
- (B) Está associada ao período pós-estirão de crescimento puberal.
- (C) O exame de imagem indicado para confirmação diagnóstica é a ultrassonografia (ecografia).
- (D) O tratamento farmacológico consiste no uso de corticoide oral e imobilização do joelho.
- (E) Está associada à maior intensidade de atividade esportiva.

22. As seguintes afirmações estão corretas em relação à varicocele, **EXCETO**:

- (A) ocorre devido à dilatação de plexo venoso da veia espermática interna.
- (B) é a causa mais comum de esterilidade masculina passível de correção cirúrgica.
- (C) a alteração de temperatura testicular pelo aumento do fluxo sanguíneo pode causar esterilidade.
- (D) durante o exame físico, a alteração da bolsa escrotal é mais evidente na posição ortostática.
- (E) a maioria dos casos de varicocele em adolescentes é sintomática.

23. Em relação ao diagnóstico de torção testicular, assinale a afirmativa correta.

- (A) Após o diagnóstico, o paciente pode seguir em observação clínica em uso de corticoides e anti-inflamatórios não esteroides.
- (B) O início dos sintomas é insidioso, ocorrendo dor progressiva durante os dias seguintes.
- (C) O exame físico caracteriza-se por um testículo em posição alta e inclinação anormal (transversal).
- (D) Entre as possíveis causas, destacam-se infecções virais como caxumba e *coxsackie*.
- (E) Podem ocorrer frequentemente sintomas de febre, disúria e secreção uretral.

24. Em relação aos transtornos alimentares na adolescência, assinale a afirmativa correta.

- (A) A relação entre sexo feminino e masculino é, respectivamente, de 10:1 na bulimia nervosa e de 5:1 na anorexia nervosa.
- (B) Os transtornos alimentares configuram a terceira causa mais frequente de doença crônica na adolescência.
- (C) Na anorexia nervosa ocorre mais preocupação com o corpo associada à impulsividade e ao descontrole alimentar.
- (D) Na bulimia nervosa o desenvolvimento de sintomas é mais precoce do que na anorexia nervosa.
- (E) Na bulimia nervosa predominam a restrição alimentar, o medo de engordar e a perturbação na percepção do próprio corpo.

25. Em relação ao uso de drogas por adolescentes, assinale a afirmativa correta referente às características dos inalantes (solventes).

- (A) Entre os efeitos agudos, observa-se redução da salivação, palidez facial sem alterações visuais ou alucinações.
- (B) Embora atue como depressor do Sistema Nervoso Central, não ocorre risco de evolução a coma e crises convulsivas.
- (C) Entre os efeitos crônicos, destacam-se sintomas paranoides, hipertensão e risco de infarto do miocárdio.
- (D) O início dos sintomas ocorre entre segundos e minutos após o uso, mas desaparecem em menos de 60 minutos.
- (E) Entre os órgãos mais atingidos pelo uso crônico, destacam-se as lesões no parênquima pulmonar.